# НАЧЕРТАНІЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ,

изданное

для народных в училищь россійской имперіи

H O

Высочайщему ловельнію царствующія Императрицы ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ.

Часть II.

Издание еторое.

Цвна безь переплета 35 копвекь.

Въ Санктлетербургъ, 1789 года.

HIMATUSOLH · Pour Hadita Amagary, Arabis on the big FREEDRICH TROUBLES winding the contract of the contract of LOUR OF THE PARTY L'ELL e designed a second of or, ogris, sali domining men (s

# Оглавленіе

# ко Второй Части Естественной Исторіи.

	стран
Животное Царство	24T
Классь 1. О Зввряхв	248
Отавл. І. О Ногошных в за	въряхъ - 256
— II. О Копышныхъ	300
— III. O ЛастовыхЪ	316
Прибаплен. О славивищихъ	
ныхБ звъряхЪ.	
Классъ II. О Пшицажь	334
Отавл. 1. О Хищных в пти	ицахъ - 338
— II. О СоровыхЪ	<b>—</b> - 342
— III. О Водяных <b>ъ</b>	346
— IV. О ГоленастыхЪ	- 351
— V. О КуряныхЪ	- 355
— VIО ВоробейныхЪ	358
Прибаплен. О знативищихъ	
ныхь ппицахь	- 362
Классъ 111. О Земноводи	ныхв 367
Отавл. І. О Бъгающих в зем	новодных збо
— II. О ПолзающихЪ	- 373
— III. О Плавающих <b>ъ</b>	377
	Классъ

	сшран.
Классъ И. О рыбахъ -	381
Отава. І. О Безперых в рыбах в	- 385
— II. О Подгорамхъ —	- 388
— III. О ПодгрудныхЪ —	- 390
— IV. О Подбрюшныхъ—	- 393
Классь V. О Насекомых -	402
Отака. І. О Жесшкокрылых Насе	ком. 406
— II. O ПолужесткокрылыхЪ	- 408
— III. О Чешуекрылыхb —	410
— IV. О Жильнокрылыхъ —	414
<ul> <li>V. О Перепонкокрымыхъ —</li> </ul>	415
— VI. О ДвукрылыхЪ —	419
— VII. О БезкрылыкЪ —	420
Классь VI. О Червихв -	- 421
Отава. І. О Кишковатых Червях	ъ 423
— II. O СлизкихЪ —	424
— III. О Черелокожных <b>ъ</b> —	- 425
Прибавл. О новоторых в осо	Services
бливых в живошных	
и Кораллахв.	128



# Животное царство.



#### § 1.

Тъла органическія, живыя, чувствующія, съ мъста на мъсто произвольно движущіяся со-ставляють жипотное царство. Наука, исторію сихь тъль преподающая, называется Зологією; а внутреннее строеніе оныхь тол-куеть Зоотомія.

#### \$ 2.

Онв состоять изъ трубокъ, раздельностію своею на мельчайшія претворяющихся после въ твердыя и мягкія тела части, по коимъ жидкія разливаются.

Примвчаніе. Твердыя части суть кости и хрящи, служащія подпорою мягкимЪ; мягкія суть мяса, движущія кости и тому подобныя; жидкія суть кровь и другіе соки въ обоихъ протекающіе.

#### \$ 3.

Жизнъ их вависить от непрестаннаго движения жидких втвль, внутри их вимъю- прихол,

as if the same and the same

щихся, и дъйствія на оныя твердыхь, вы коихь онъ содержатся.

Примвисите. Къ непрерывному содержанію таковаго движенія животное тело побуждается дыханіемъ, а къ возстановленію утраченныхъ действіемъ силь насыщеніемъ себя новою пищею.

#### \$ 4.

Чупстийя суть собственно душевныя свойства, оказующияся вы твлё приятнымы или неприятнымы видомы оты внё или извнутри получаемой причины.

Примвчание. Онв обитають вы нервахы, произходящихы оты мозгу и раздыляющихся по всему тылу; но дыствие ихы вы прочихы животныхы есть склонность, а вычеловых управляеть ими душа.

#### \$ 5.

Произвольное съ мъста на мъсто движеніе есть исполненіе требуемаго тъломъ премъненія настоящаго покоя. Примвиснае. Оно производится мускулами, сжаттемь или распущентемь себя твердыя части поворачивающими:

#### \$ 6.

Наибольшей части животных в твла раздвляются на голопу, тулопище и члены.

#### \$ 7.

ВЬ голопь содержится мозгь, отв котораго внутрь и внв по всему твлу разпространяются нерпы или чувственныя жилки.

#### \$ 8.

Нервы, кончащиеся съ особливымъ устройствомъ въ извъстныхъ тъла мъстахъ, составляють такъ называемые Органы чупстиъ, въ коихъ производящияся извит перемъны нагрицаются чупстини.

# \$ 9.

Таковых в явный ших в чувств в почитается пять: глаза зрыне; уха слышане; носа обоинне, языка икусь; кожи о язане. Внутреннеежь строене оных чувств : глазь, сложенный шарь из перепонок и разных внутри жидкостей, в в коем зрительный нервы

входя изЪ мозгу разстилается по внутреннему дну въ видъ перепонки, коею принимаеть на себя всв внв находящіяся предмвтовь изображенія и составляеть зръніе. Ухо, хрящевая въ головной кости, различно образованная труба, по коей внутри разпространяется входящій из мозгу слышательный нервь, представляющий главнымь своимь отрывкомь на перепонкв, вившнее ушко от внущенней трубы отделяющей, натянутую струну, коею всв внв производящиеся звоны сообщаются по трубъ мозгу, и сте называется слышание. Носъ, средственное напереди лица пустое возвышение, наполненное разными легкими извилистыми косточками, одътыми, такъ какъ и вся внутренняя сторона носа. мокрою перепонкою, по коей нюхательный нервь изь мозгу разпространяется для приняній на себя всяких в изпареній или запахов в и сте есть обоняние. Языкв, мягкая во рту часть, по коей два отрывка от пятаго изъ мозгу нерва, вкусительными называемые, прожодя на повержности, оканчяваются сосочками, принимающими на себя двиствіе разпущающихся по нимъ тъль, и сте составляетъ вкусЪ.

вкусъ. Кожа, внёшнее всякаго тёла покрывало, въ которомъ чувственныя жилки изъ мозгу и хребтовой мозговины разпространялсь оканчяваются на поверхности сосочками, производящими въ душё чувстве, называемое осязанемъ.

Примвчание. Не всв живошныя имвють всв си чувства, но разнствують оть совершеннейшаго человека или меньшимы числомы оныхы, или лучшествомы того либо другато чувства, награждающаго недостатокы прочихы.

#### \$ 10.

Тулопище называется средняя между головою и членами часть, содержащая въ вержней половинъ сердце и легкое, а въ нижней желудокъ, кишки, почки и проч.

Примвисніе. Сердце служить для пріятія въ себя изъ небіющихся жиль и попиранія изъ себя по біющимся жиламь крови; оть чего произходить круговое въ тьль крови обращеніе. Легкое для пріятія и
изпущенія гортанью водуха; оть чего произходить дыханіе. Желудокъ для варенія
П 3 снь-

Сварившейся пищи питашельнаго тьлу сока и изпражнентя ненадобнаго (§. 3.). Почки для отдълентя изъ крови питательнымъ сокомъ снабженной лициней влажности. Прочтя черева, къ чему каждое служить, толкуются подробнъе въ Анатомти.

#### SII.

Члены сушь части тела, у разных животных разные, служащие собственно къ движению его съ мъста на мъсто.

#### § 12.

Все сте животное тьло покрывается снаружи кожею, изъ коей для большаго прикрыття и защищентя выростають на поверхности различныя вещества: шерсть, перья, чешуя, кожухъ; или по крайней мъръ для прикрыття голой кожи имъстся на ней вязкая слизь.

#### § 13.

Натуральнейція должности животных ратель суть: хранить бытіе свое и доститать до того конца, на которой оне по естеству своену определены.

#### € 14.

живошныя шела разсеянно Обитають но всему лицу земному: на землъ и въ землъ; на водь и вь водь; на воздухь и вь воздужь и проч. По чему и устроены такь, что каждое въ своей токмо сферъ и способно отправлять возложенную на него отв естества для всеобщаго блага должность.

#### 15.

мъстамъ виднъйщія че-По всъмъ симъ ловъческому оку животныя можно раздълить по внутреннему на три, а по внышнему виду на шесть КлассовЪ:

- Имъющія сердце I. двужелудочное и двуушковое; кровь крас- Лица носящія. сную, теплую.
- 2. Сердце одножелудоодноушко-И вое; кровь красную холодную.
- 3. Сердце одножелубезь ушка; **ЗОНРОД** вмѣстю крови бѣлой сокъ холодной.

Живородящія, Забри. І. Птицы 2.

произвольнодыщаніня, Tazol. Жабрами дышащія, Phiobi. 4.

Ускованыя, Насекомыя. 5. Щупальцовыя, Черпи. б

 $\Pi \Delta$ 

§ 16.

# \$ 16.

Числа ихъ различныхъ видовъ по неизвъстности многихъ на земли странъ утвердить не можно; а для соразмърности произведенти во всъхъ трехъ царствахъ, и сколько въ какомъ классъ животнаго оныхъ имъется, можно положить такимъ образомъ: Звърей 300; Птицъ 2000; Гадовъ 700; Рыбъ 2000; Насекомыхъ 15000; Червей 5000; такъ что въроятное количество всъхъ видныхъ животныхъ различныхъ видовъ простирается до 25000.

# Классъ Первый.

О зввряхъ.

# \$ 17.

Звърями называются такія животныя, кои строеніемь своего тьла, черевами и органами чувствь наиболье подходять кы человьку; наипаче же кои по рожденій себъ подобныхь живыми питають ихы имьющимися на тьль сосцами. По внутреннему строенію см. § 15

#### 

Наибольшая изъ нихъ часть четвероноги, обитають съ нами на сухомъ пути въ различныхъ областяхъ; немногія величайшія; имьющія вмъсто ногъ ласты и пліоскъ, скрываются въ Окіанъ.

#### § 19.

Тъло ихъ снаружи покрыто кожею, болъе или менъе толстою, изъ которой выростаеть густая или ръдкая шерсть, превращающаяся у инныхъ въ щетины, иглы, честуи, или и совсемъ въ цъльные щиты.

#### \$ 20.

Ноги у нихъ оканчяваются у инныхъ пальцами, поконецъ коихъ имъются различнаго вида и величины ногти; у инныхъ копытами, кои бываютъ также на нъсколько копытокъ раздъленныя; у инныхъ совсемъ особливаго вида, такъ что представляютъ будто сростеся пальцы вмъстъ (ласты), а задне даже сростяся и самыя ноги (лягоскъ).

#### 9 21.

Питаются инныя другими животными, хищныя или плотоядныя; другія прозябае-П 5 мыми - півлами, *траноядныя*; инныя півмі и другимів.

#### \$ 22.

Родять однажды вы годь, либо дважды, числомы разныя разно, и при томы инныя слыпыми на нъсколько дней, другія зрячими-

# \$ 23.

ВѣкЪ хотя многихЪ совсемЪ неизвѣстенЪ, и весьма мало, кои избѣгнувЪ насильной смерти достигають положеннаго каждому своего конца; однако въ извѣстныхЪ звѣряхъ бываетъ наиболѣе между девятью и сорокью лѣтами.

#### § 24.

Прочіє звъри по ногамъ раздъляются на три отдъленія: на ноготные, колытные и ластопые.

# \$ 25.

Польза от вверей для человека от разных разная: шерсть, кожа, мясо, жилы, сало, молоко, зубы, рога, кости и другія обобыя вы ихы теле приготовляющіяся вещества; и по тому инные изы нихы употребляются для домоводства, другіе для охоты

за другими звърями; инные для тяжестей и работы, другіе немногіе содержатся для любопытства.

# § 26.

По строенію тьла человькь есть подобное прочимь звърямь животное; но изяществомь своея души, превосходствомь дарованій, представляеть царя и владыку, для коего прочія твари живуть.

#### О Человъкъ.

# \$ 27.

Челопькъ вездъ себъ подобень и составляеть единый токмо родь вы поднебесной Положение его вертикальное; тъломы должены быть статень и во всъхы частяхы своихы соразмърены; величиною между пятью и щестью футами; цвътомы бълы. Всемы симы однако различествуеть оны по разнымы странамы разно, и сие не оты инаго чего произходить, какы оты климата, образа жития и пищи \*).

\$ 28.

<sup>\*)</sup> Описанте его тъла и жизни смотри въ Бюффонъ и Лингеъ,

Тлавнъйшія его различія находятся въчетырехь частяхь свъта, Европъ, Азіи, Афрнкъ и Америкъ; и въ каждой изъ сихъ сверхъ того отъ смъщенія разныхъ народовъ произошло множесшво отличій.

#### Примвчание.

По виду; примътнъе отличаются въ Россіи: Калмыки, имфющіе голову круглую и плоское лице съ узенькими горизонтальными глазами, малымъ ртомъ и мълкими зубами; волосы черные и жесткие; а твломъ средственны и тощи. Камчадалы имъють лице плоское несоразмърное, глаза въ ямъ, нось плоской, тъломь брюхасты, а ноти тонкія. Самовды и сосвяственные имъ народы лицемъ сходствують съ Камчадалами. но скуласты, длинноруки, коротконоги, широкоплечи, малобороды, ВЪ инныхЪ земляхЪ: Китайцы имвють лице плоское, почти четвероугольное, у котораго маленькіе, узенькіе, толстовъкие глаза находятся въ отдалении одинъ отъ другаго въ большихъ яминахъ и при томъ внутренними углами къ малому,

широкому и почти вдавленному носу ниже, нежели внъшними; борода у нихъ ростеть токмо на переди длиннымъ клокомъ; прочее тьло толсто и неуклюже. Жители Огнений земли имъютъ широкія, плоскія лица съ малымъ лбомъ и узкими черными глазами, большія скулы, нось широкой съ большими ноздрями, большой роть и мълкіе неровные зубы, безбороды, а тъломъ крупны и здоровы, но руки и ноги тончавы.

Б. По величинв: Лапландцы и прочіе ближе къ Съверу живущіе народы, кои вышиною всегда меньше пяти футовъ бывають. Равнымъ образомъ по ту сторону Екватора въ Мадагаскаръ на высойчащихъ горахъ обитають люди, кои вышиною едва до четырехъ футовъ достигають.

В. По цвъту, который во всъхъ упомянутыхъ народахъ различень, далъе чъмъ ближе къ Екватору, тъмъ болъе премъняется въ желтый, черный, красный и проч какъ видимъ въ Персіянахъ, Индъйцахъ, Ебіопахъ и другихъ по островамъ и на матерой землъ подъ Екваторомъ обитающихъ народахъ. примвисние. Кромв сихв отв естественных причинь произходящих различий
урождаются нередко вы каждой стране люди или отменной величины, называемые пеликаны, кои вышиною отв обыкновенной до
8 футовь достигали; или отменной малости, карлы, кои тридцатиседмилетние меньте полутора фута вышиною умирали; или
попадались обоего пола неоднократно такие,
кои образь диких человековь изображали.

# \$ 29.

Сроднейшая человеку на земли страна есть теплая, где и должень по природе своей обитать обществомь; но мысль, дары души человеческой, съ которою онь сотворень, подь разными нуждами развлекла сей родь по всемь краямь земли и заставила жить и промышлять себе той стране сообразно.

#### \$ 30.


Натуральный шая вства человыка есть плоды и коренья прозябаемых в тыль, а питье вода; но перемынивы климать, перемынивы мънивъ образъ жизни здълался онъ наконецъ всеядцемъ.

### 2 31.

Местидесянью и осмидесянью льтами; изь коихь девять мьсяцовь носямь вь утробь материной; до семи льть по рожденіи младенець; до четырнадцати отрокь; до двадцати одного юноша; тридцати льть мужь;
пятидесяти пожилой; семидесяти пяти старь; а далье дьдь, изь коихь нерьдко бывали такіе, кои за сто шестьдесять льть живали.

# \$ 32.

Должность человъка, сверхъ естественныхъ нуждь, о коихъ толкуетъ физіологія, есть разматривать самаго себя и прочія созданія, и по тому доходить до познанія вся создавшаго.



#### Опавленте І.

#### О Ноготных звъряхъ.

#### \$ 33.

Ноготные зпери, называются такіе, кои имеють у себя на ногахь оть двухь до пяти различнаго положенія, величины и соединенія пальцы, оканчевающіеся разнаго вида и крепости ногтями (б. 20).

#### \$ 34.

Изъ нихъ наибольшая часть хищные; питаются мясами другихъ животныхъ, немногіе прозябаемыми; рожають по многу.

#### \$ 35

Они составляють прямые мягкой рухляди Россійскіе промыслы, коими занимаются столько дикихь народовь.

Примвнание. Для удержанія сих промыслово навсегда во цветущемо состояніи, надобно предоставить зверямо свободу водиться во любимых имо лесахо, водахо или областяхо, обыкновенно и безо того ко населенію неспособныхо, и смотреть чтобо ни вырубаніємо, ни выжиганіемо, ни частымо посещеніемо сій страны, ниже безвременнымо ловомо самые звери не были обезпокоиваны.

# Извъстнъйшие изъ нихъ своею лользою въ Россіи:

1. Собака, песь, кобель, сука. Изв всвхв живопиных в наипривычитищая кв человъку величиною, шерстью, цвътомъ, наружностію и всемь прочимь различествуеть до безконечности; питается мясомь и желудокь ел развариваеть даже самыя кости; по нуждь ъсть и прозябаемыя тела. Щенится дважды въ годъ; носитъ два мъсяца и три дни; приносить отбодного до тринадцати; щенята по рождении и дней бывають слепы. лучиее ся чувство обоняніе. Чтожь сается до свойствь ея, то во нервыхь, что она ни въ какте жары и ни при какомъ движени не пответь, а разгорячившись высовываеть языкь; бользиямь подвержена наипаче глистамь и бъщенству; у больной нось дълается теплымь; вы малыхы припадкахы льчить сама себя рвотою проглатывая обыкновенную на лугахъ колосную праву называемую Грамень канинумь. Въкъ ея обыкновениве

кновенные до четырнадцати лыть, рыдко до 20 прости ается. Содержится въ домахъ за красоту свою, за ласку и привязанность къ хозянну, за върность, отважность, дресть и пояятность. Вь жизни обучають на многія службы, а паче того, что умногих в народовь в Сибири употребляются для взды. По смерши св лучших в собакв употребляется шкура на мъхи, на опушку и проч и въ такомъ случав нервако подкрашивають ее или разпятнывають на образець тигровь, барсовь, или какихь другихь звърей; изъ кожи дълають лайку. Мясо въ Китав и некоторых других землях употребляется вь пищу.

Примъчание. Разныхъ породъ собакъ щитають до 34; но въ России извъстны подъ особливыми именами нъкоторыя токмо знативищия породы на прим: леганая, гон ая, бо зая, брудастая, хортан, дпороцая, меналикая, шафка, молса, пыжликъ, а прочия нарицательныхъ имянъ не имъють.

2. Волкт, Билок, хищной звърь, сигружи похожь во всемь почити на большую собаку; но отличается сыв оной съроженто-

Bamore

ватною съ чернью шерстью; черепъ и рыло толще въ сравнении къ собакъ: жвостъ пушистой, прямой. Находится во всъх настяхъ выходить на добычу по зарямъ всю ночь; нападаеть на овець, оленей жеребящь и самых в собакь и проч. Тав же знаеть, что ему съ большимь звъремь одному не сладить, соглашаются до нъсколька волковь вмъсшъ и или загоняющь съ разныхъ сторонь, или залегии вы кусты и вы траву дожидають, покудова самь ближе подойдеть. Закрадывается въ деревняхъ въ скотные и птичьи клевы, тав всвхв передавивь уносять сь собою цълыми баранами, ивь семь наиначе способствуеть ему толщина и кръпость челюстей и шеи. Духв живаго звъря или мертвечины слышить издалека; для надежной поживы следуеть за войсками. Сколь ни прожорливь, однако голодь при и четыре дни терпъть можеть, лишь бы питья не недоставало; вы сильномы голоды не спущаеть и самому человъку. Щенятся однажды вы годы вь выкопанных в норахь, по тести и седмия слепыми на девять дней; до году щенята не втетають от манки, и когда перестануть

чрезь нъсколько недъль сосать, то питаются всв вмъстъ добычею изв материных в челюстей. Живуть до двадцати льть. Боавзнь опасная вы нихы бышенство. По осторожности его многія средства кЪ ловитвъ его были тщетны, а по наносимому вреду во многижь государствахь изтребление волковь платимо было поголовно. В Россін ловять его Калмыки Беркутами, другіе народы самострълами, капканами, кои съ приманою зарывають вь снъгь, чтобь никакой примъты было не видно. Стръляють изв ружей, го няющь отборными собаками, ловящь сттьми, отравою, ямами, въ которыя когда попадешся, то теряеть всю свою бодрость, и послъ, ктобъ другой въ ту же яму ни попался, никому не вредить. Употребляется его шкура на винчуры, муфпы, попоны и проч. мясо вдять Калмыки; зубы въ лощеніи у золотарей, ръщиковь, переплетчиковь и проч.

Примвианіе. Вообще волки бывають шерстью несколько различны, и сіе произходить оть климата и старости: старые и въ Северныхъ странахъ находящіеся щіеся былье. Вы Перміи понадаются всемь черные.

3. Лисица, тылка. Звърь лукавый, личиною поменьше и посубщилнъе обыкновенной дворовой собаки; рыло имъетъ острое; обыкновенная шерстью рыжая съ бълымъ брюхомЪ, хвостЪ (труба) пушистой сЪ бълымЪ кончикомъ. Находится повсюду вы лесахы, степяхь, горахь; но живеть вы норахь. Обыжновенные жилище себы избираеть не въ отдаленности отв жилыхв мъств и загородных домовь сь тъмь, чтобь по ночамь закравшись въ крестьянские курятники, гусятники и тому подобное, передавивъ таскать кЪ себъ пошихоньку вЪ добычу; вЪ лъсахЪ питается она коварствомь уловляя такихь звърей и птицъ, съ коими ссилитъ, на прим: зайцы, кролики, мыши, утки, тетери; не гнушается также рыбами, ящерицами, лягушками и насекомыми; равнымъ образомъ не отмътаетъ сочные плоды. Приноситъ по пяти и седми лисенять, коихъ кормить сперва молокомъ въ норъ, а по томъ ловитъ имь малыхь звърковь и птичекь. ЖиветЪ онів 10 до 13 летів. Промышляютів лисиць P 3

для шкурь. Вь Россіи стръляють ихь изь луковь и ружей; гоняють собаками и хищ- ными птицами; вырывають изь норь, выливають водою, или выкуривають дымомь; становять самострълы, капканы и отраву. Употребляется ихь шкура вь мъхи, которая лучше зимняя, нежели лътняя; мясо вдять нъкоторые дикіе народы; жирь и кровь почитаются лъкарственными,

Россіи множество, не говоря про бѣлыхь, кои или такь урождаются, или молодыя вскормленыя дома премѣняють рыжій свой цвѣть вь бѣлый, есть еще огненки, сиподумики, крестопки, сѣрыя, бурыя, черныя; изы коихь послѣднія двѣ самыя дражайшія и самыя лукавѣйшія, кои ловятся вь восточной Сибири, а наиболье по Алеутскимь островамь — Къ симъ же различіямь можно причесть Караганку или степную лисичу, которая отлична оть обыкновенной чернымь на хвоетѣ кончикомь; корсака, который поменьте лисицы и сѣдѣе; Шакала, который больше лисицы, цвѣтомь желтый съ профадью

ставно, водится въ полуденной России около. Кавказа стадами.

4. Песеця, величиною и наружностію походить на лисицу, но глупь и непроворень, шерстью бываеть двухь сортовь: былые какъ снъгъ, кои лътомъ бурьють, и гозубые, кои зиму и льто цвыта своего почти не перемъняющь. Примъщны наипаче своими ногами, кои такъ какъ у зайца снизу одъты густою шерстью. Находятся по Съвернымь тундрамь; обитають вы норахь; пимышами а наипаче пеструшками. Носять от пяти до седми, кои покудова живуть вь норахь называются норинками, а котда стануть опіставать оть матки и шерсть начнеть подыматься сь плечь гуще, тогда называють въ Сибири крестопиками; посля недолесцы св недоросшею шерстью и рослолесцы совершенные песцы. Промышляють ихъ стръляя изъ луковъ, ловя петлями, выкапывая лопашками, въ коемъ случав если нашедь нору при отверзти оя поскребешь, то кроющійся в норв песець тотчась по дасть голось, туть ли онь, или нора пустая. Ловь ихь бываеть годами: ибо они TO

тоняясь за пеструшками переходять, такъ какъ и сій, изъ страны въ страну и возвращаются обратно иногда черевъ три и четыре года; по проявляющемуся количеству пеструшекъ жители заключають, каковъ въ томъ году и ловъ песцовъ будеть. Употребляются ткуры ихъ на мъхи; голубые дороже бълыхъ; мясо на промыслахъ ъдять Остяки и Самоъды.

5. Коть, кошка, домовый звърь, противный собакъ и совсемъ противныхъ оной Они произходять отв дикихв, свойствь. обитающих по лъсамь вы полуденной Европъ и сосъдственной ей Азіи, которые шерстью наиболье бывають сърожелтоватые съ прочернью, на мицъ, хвость и на ногахъ съ темными полосами и пятнами. Въ дому привыкаеть только вырощенная, а старая занесенная всегда показываеть некоторую дикость и недовърчивость; наилучиее ея чувство слышаніе; глазомь видить даже и ночью; когда обыкновенно и производишь свои худые и добрые промыслы; любить чистоту и не терпить на тьль никакой мокроты; изь шерсти оть тренія вь темномь мъсть изпу-

изнускаеть електрическія искры. Ходить неслышнымь образомь, и вь прочемь движеніи легка, гибка и весьма проворна; съ какой вышины ни бросишь кошку, всегда она умъеть уровнять своимь тъломь, чтобь не иначе пасть, какъ на ноги; голодъ сносить долго: примъчено, что 14 дней могуть жить без всякой пищи; питается мясомв, рыбами, но не тсть горячаго и соленаго; носяпь по четыре, по пяти и по шести котять, дважды вь годь. Живуть до 15 и до 20 льть. Вообще кошечій родь дурных качествь, но терпъть оныя въ домахъ заставляетъ безпокойство, причиняемое крысами и мышасмерти употребляются ихъ шкуры на недорогіе мъхи, однако лучшіе почитаются черные и дымчатые, коих много вь Сибири; мясо фдять Китайцы и нъкоторые другіе.

6. Рысь, гораздо больше кошки и переднія лапы толще и сильнье; шерстью сврожелтоватая съ темными наипаче по ногамъ пятнами; примътна наиболье короткимъ своимъ черноконцымъ жвостомъ, острыми съ бородками ушками. Водится во всъхъ черныхъ

льсахь, гдь нападаеть даже на оленей, лосей и другихь скотинь, спрыгивая сь деревь и уцьпившись за горло грызеть до тьхь порь, покудова свалится сь ногь; упавшаго сосеть кробь, разворачиваеть черепь, вывдаеть мозгь, а прочее тьло оставляеть на мьсть; иначе питается зайцами, дикими козами, куницами и даже дикими кошками. Носить по три и по четыре рысенка, кои кроеть подь густыми кустами, вь дуплахь и вь расселинахь. Живеть до 15 льть. Промышляють ее собаками и пастьми для красивой ся шкуры, кося волосы однако ломки и скоро вытираются; переднія лапы продаются особо,

7. Камчатской Бобов, по Камчатски Калань, длиною бываеть фута вы три, но не толсть; на ногахы низокы; голова плоская; рыло толстое, вы коемы зубы, какы у всыхы жищныхы звырей сы клыками; шерсть на немы темная, подходящая поды черную, мягкая какы пухы сы сыробыльсоватымы подсыдомы; жвость круглой, вы четверть длины всего щыла, волосастой, а ноги всы соединены перенонкою. Находится вы Камчаткы и по островамы островамЪ восточнаго Окјана около береговЪ рѣкъ и озеръ, куда они зимою и лътомъ съ моря заходящь; они плавающь и ныряющь весьма искусно и проворно; отдыхають на сухомъ пути или на льдинъ; въбоязливости своей спасаются бъгомь увертываясь вы ту и другую сторону, а нагнанной иначе защищаться не знаеть, какь припавши кь земль, или когда ударишь палкою, топпась представляеть себя мертвымь. ВпрочемЪ звтрь весьма веселый и въ обществъ своемъ дружелюбный; пиптается наиболье рыбами и другими морскими живопіными; съ самкою своею живеть безьотлучно, покудова одинь таго не лишишся; носить по одному бобренку, котпораго самецЪ и самка любятъ весьма горячо. Живупів долго; подв старость съдъюшь. промышляють ихв различно для цънной, теплой и прочной ихъ шкуры. Съ худых в и изношенных в шерсть употребляется вь дело лучшихь бобровых в шляпь.

8. Тюлень, Нерьпа, съ головы похожь нъкоторымь образомь на собаку, но толстая, будто раздвоенная верхняя губа съ большими жесткими усами дълаеть нъкоторую отъ оной

оной отмину; голова круглая безь ушковь; ноги переднія по бокамъ тівла, соединенных толстою перепонкою И только одни нотти видны; заднія также соединенныя, проспираются назадь и межь ними коротенькой хвостикЪ; шерстью по различію вида бывають различны, наиболе стрые съ стаиною. Находятся во всвхв моряхв, плавая голову поднявЪ ввервхЪ; на зиму убираются вЪ теплъншія страны, или держатся около не замерзающих в мъсть; живуть также и подо льдомь, но по необходимости въ дыханіи продувають изь подь воды пролубь, либо только для дыханія, либо и для выходу на ледь, чтобь спать на солнцъ. Питаются рыбою, наипаче гоняясь за сельдями; рожають по одному и по два. Промышляють ихь ради кожь, употребляемыхь для обитія сундуковь, чемодановь и проч. также и сала, носками, палками, стрвляніемь, свтьми и Онъ живущи; въ отчаяни защищаются зубами жестоко; самцы сердитье самокЪ; пораненые, или лишившись самки, либо дътей, лежа на солнув плачуть весьма слезно. Когда же побъгушь по сухому пуши MAN

или по льду, то изрыгають подь себя воду и слюну, чтобь скользти скорте, а задними попираясь, что вы нижыми попадеты, льдин-ки, песокы или камышки, мечуть вы преслъдователя довольно далеко.

9. Кость морской, сь внешняго вида и цвътомъ шерсти похожъ болъе на медвъдя, но вь груди гораздо толще, а къ заду тонте; также соединенные передних и задних в ногь пальцы отличають сего звъря оть онато; а что онь по большой части на берегахь острововь и на льдинахъ садищся на заднія ноги опершись передними, прозвали его котомъ морскимь. Водится по островамъ Тижаго моря большими стадами, гдв часто дерушся забишимь образомь сь одного начиная до цълаго стада. Весьма живущи и немилосерды, какЪ для самокЪ, такЪ и дътей своихЪ; старые не ввши жизнь свою проводять во снъ; плавають весьма быстро. Питаются рыбами, тюленями, бобрами и другими живошными, а вы недостаткъ и морскою капустою. Промышляють ихь носками и стрьхами на ремняхь для кожь, употребляемыхь Камчедалами и другими народами на ременныя и прочія домашнія нужды, и сала, ко-

10. Сипуча, называется птакже Лепъ морской, но название сте сходствуеть токмо по цвъту шерсти и гривъ около шеи, кактя левь имветь, а не по другому чему; самки тривы не имвють. Самцы величиною бывають окопрехь сажень и чемь далье къ хвосту, тъмь тонъе; голова круглая съ усами, бровями, на носу пузыремь, который во время осерчанія надувается, и множествомь во рту острых вубовь. Водятся вы тихомы моры по островамъ, семьями, гдъ и драки учиняющь за мьсто и за самокь. Питаются рыбами и другими морскими звърями. Камчада лы промышляють ижь сонных стрылами на ремняхъ пущенными для мяса и сала, которыя вдять, а изв кожь делають обувь, платье и подбивають лыжи, такь какь и всеми другими мелкошерстными морскими INMROTES.

и. Моржь, звырь морской, поліциною сы Черкасскаго быка, имыющій голову небольтую, круглую сь раздвоенною верхнею губою и жесткими усами; изь верхней челюспи ети торчать внизь два больше и длинные вуба; переднія лапы разплечисты, у коихЪ пальцы соединены такъ, что видны по конпамъ одни токмо ногии; заднія лежать между собою весьма плошно, однако между ими видънъ маленькой жвостикъ; шерсть на немъ гладкая, корошенькая, шемнобурая. жодится въ Съверномъ Октанъ плавая въ водахв и выходя, наипаче посредствомв переднихъ своихъ клыковъ, на острова и льдины, гав отдыхаеть на солнув. Питается морскою кануетою и другими морскими веществами. Родить по одному и по два. мышляющся носками для шкурь, сала и клыковь, изь коихь шкура наиглавивише употребляется на ремни подъ кареты, сало на шерстяныхь и кожевенныхь заводахь, для очищения шерсти и выдълки кожъ; клыки или тинки для точенія и ръзанія разных в костяных вещиць.

12. Морская коропа, колустникт, величиною сь моржа, но во рту не имъеть другихь зубовь кромъ коренныхь; заднія ноги срослись вь одинь горизонтальной хвость; терстью покрыты свробурою. Находится по острожамь Тихаго моря, откуда заходить и вь

ръки, но недалеко от моря и на землю никогда не выходить, развъ на подводныя мъли, гдъ жреть безпрестанно морскую капусту; плаваеть высунувь голову изь воды на ружу, а когда всть травы подъ водою, то видна только одна спина. Рожають по одному и любять, самець самку, и оба дътей своихь такь, что гонятся за ними поманными до самаго берегу, а послъ еще нъсколько дней на то же мъсто искать ихъ возвращаются. Промышляють ихъ носками и стрълами для кожь, употребляемыхъ такъ какь и Сивучевыя, сала и мяса наипаче молодыхъ, до коихъ лакомы дикте островскте народы и Камчадалы.

13. Выдра, порышна, станомы похожа на Камчатскаго бобра, но меньше, шерстью темножелтая, жестковатая и лоснящаяся; ноги также соединены перепонкою; длиною вся вы аршины. Водится повсюду около рыбы, прудовы и озеры, гды и роеты себы вы беретахы норы. Она плаваеты и ныряеты вы воду, по большой части ночью, для ловления себы рыбы, которую выносить всть на берегы, зимою пролубями или полыньями. Нерыдко гоняясь

тоняясь за рыбою запушывается вы сытяхы, амбо попавшись вы силокы ногою остерванывается столько, что отвыдаеты себы ногу, дабы освободиться, или подстрыленная уходить вы воду и тамы уцыпившись за что нибудь зубами сы тымы умираеты. Носиты по три и по четыре. Промышляюты ихы сколько для наносимаго ими рыбы, наипаче вы прудахы и озерахы вреда, столько и для ткурокы на одежду, наиболые ловушками и силками, чтобы не повредить оныхы.

14. Нерка, станомы, наружнымы видомы, образомы житія и пищею похожа на выдру, но меньше идлиною не болье фута: терстью темнье выдры. Живеты также при водахы; питается рыбою, раками, лягушками, раковинами и водяными насекомыми. Промыніляють ее также за вреды, который она! причиняеть вы садахы и прудахы, но шкурка ея по недоброть своей не вы большемы почитеніи.

15. Хорідкі, звірокі длиною больше фута, иміющій шерсть желтоватую, а ось черную около тлазі и рыла білівсоватую; ноги и брюхо черныя. Находится ві уміренных і

мъстахъ Россіи по полямъ, стенямъ, около жильевъ и развалинъ. Питается птицами, ихъ яицами, мышами, лягушками, и пчелами, кои промышляютъ наиболье ночью. Нравомъ весьма золъ. Носять молодыхъ по тести, коихъ кормятъ до поздой осени. Ловятъ его для шкурки, которую подкращивая дълаютъ приятнъе, но она никогда своего дурнаго запаху не теряетъ.

16. Перегузня или Перепязка, во всемь пожожа на Хорька, только уклюжье и шерсть имъеть кофейную сь желтыми неправильными пятнами; попереть лоа проходить бълая полоса, оты которой чаятельно и имя перевязки полусила; ноги и брюхо черноватыя. Нахохится наиболье между Болгою и Дономь. Питается мълкими звърками, но не всемь тъмь, что Хорокь любить. Впрочем, сходствуеть сь Хорькомь. Промышляють ее для шкурь, которыя однако по некрасивости своей не вь большомь почтении.

то мерстью весь желшый и водится токмо вы полуденной Сибири, гдв промышляють его для шкурь, походимыхь вы Китай,

- 18. Горностай, маленькой зверокв, длиною менве фута, имвющий шерсть мвакую, бваую, которая автонь на спинь перемыняется вы желтобурую, а конець жвоста всегда черный. Находится повсюду, а болбе вы Съверных в мъстахъ по перелъскамъ и около жила, тается бълками, мышами и малыми птичка. ви. Ловять его силками, настьми и друтими довушками для шкурокв, кой зимнія; бълыя почитаются лучийя, нежели льтнія; жеосты продаются особо; изб былых шкурокь со вшитыми жвостами шьются Княжескія маншій.
- 19. Лоске, во всемь похожа на горносшая. но меньше и на жвость чернаго пятна не имжеть.
- 20. Куница, Кидосъ, звъроко побольше Хорька, длиною вв полтара фута, покрытый піемноватіою, люснящеюся інерсіпью, у коея подсадь сврожентованый; ноги и жвость чемь ближе къ концамь, шемь шемнее; гордо желтаго цвъта. Паходится въ средней подось России по лесистымь горамь, обитая вь дуплахь, подь корнемь, или вь ппичьихь тивздахв, отвуда промышлять выходить

токмо ночью. Питается наипаче бълками, мышами и другими зверками, также рябиной, яблоками и другими ягодами и медомъ. Носять от 5 до 8. Промышляють ихъ по всъмь Уральскимъ хребтамъ различно: силками, пастьми, стрълянтемъ изъ луковъ тустыми стрълами, гоняя собаками и проч. Употребляется ея шкурка въ мъхи, которая подходить къ соболиной, но она нъсколько грубъе.

21. Соболь, со вившняго виду почти похожь на куницу, только немного меньше, толова острве, уши побольше, шерсть подлиннве, мягче и лоскаве, подсадь сврый или дымчатый, ось темнобурая или черная; ноги главнвишее волосистве, нежели у куницы; же различие между соболемь и куницею состоить вь жвоств, который у перваго короче протянутых задних ногь и весь черный, у последней же длиние и къ концу покмо чернве становится. Находится въ Сибири но лесамъ, въ странахъ чемъ мене населенныхЪ, темъ многочисленнее; обитаетъ вь норажь подь кореньями, вь дуплажь и рассвлинать; нитается мыщами, бълками, горносшаями,

ностаями, зайцами, куропатками и разными ягодами, за которыми ходить по ночамь; днемь спить, и такь крыпко, что не только стучать по дереву, но и въ руки его взять можно. Носять по четыре и по пяти. Ловять ихв пастьми, ловушками, петаями; выкуривають изь дупловь и норь дымомъ въ същяные рукава; гоняющъ собаками, от в коморых в бътуть долго на дерево не бросаясь, а взошедь однажды уже редко сходить сь онаго, а норовить скакать безпрестанно съ одного на другое, и въ такомъ случав лучшее средство стрвлять по немв изь луковь тупыми стрълами. Въ Сибири, наипаче въ Нерчинской области, по Витиму и другимь вь Лену впадающимь ръкамь, производятся промыслы лучших в соболей чрез всю зиму, отправляющимися нарочно за тъмъ большими шайками промышлениковь; самые дорогіе почитаются черные; другіе не столь черные подкрашивають искусно, однако не такъ, чтобъ разпознать отъ природныхъ было не можно. Поиманные разбиваются на жребшы, черева, лобки, и лапки, изв коихв, вськь порознь, составляють мехи. Хвосты

продающся особо. Дражайшіе стоють оть 30 до 40 рублей пара; другіе продають сороками, а хвосты сотнями.

22. Медива: звврь больной, имвющий ртерсть косматую чернаго или бураго цвъта; находинся вы дремучихы льсахы и по горамы, тав и спроить себь берлоги изв валежнику, хворосту и мху, вы коихы лежить всю зиму питаясь жиромь, высасываемымь изь лапь; автомь пинается ломая лощадей, коровь, мертпвечиного, этодами, пчельниками, муравьями и другими насекомыми. У свахенного звъ ря сосеть сперва кровь, а по шомь есть мясо, сколько же не добств, зарываеть вы грязь, или закладываеть жворостомь. Быгаеть нескодо и при том в ковылля на четырех в ногах в; но ходить также и на двухь; дазить на деревья и спущается оттуда задомы винаь; плаваеть по водь, гдь нерьдко ловить и рыбу, отв коихв иств только головы; зашищается передними дапами; ударомъ по переносица легко убивается до смерти; носять от двухь до няти, коих кормять молокомъ покудова изъ берлоги не выидушь, алюсь ходань сь ними безбошлучно, поку-LOBA

дова не зачнуть новых молодых и тогда молодые дълають себъ берлоги сами въ
сосъдствъ маткиной съ тъмь, чтобъ на слъдующее лъто еще ходить съ оного и съ новорожденными медвъдятами. Живуть весьма долго. Промышляють его различно: стрълянтемь, ходя съ рогатинами, напанвая виномь и многими другими хитростями. Употребляется его ткура на винчуры, шапки,
муфты, полсти, попоны; мясо его годится
въ пищу, а жирныя лапы подаются на столы знатныхъ; сухтя жилы, Лапланддамъ служать вмъсто нитокъ: желчь и жирь лъкарственны.

Примечаніе. По берегамі кі Сіверному Окіану и по островамі, ближе кі полюсу лежащимі, находится особливый роді білыхі медвідей, которые гораздо больше нашихі черныхі медвідей, и длиною бываюті оті семи до двенадцати футові; собою білые какі снігі, и только глаза и губы черныя; шерсть также длиная, но ніжніе и лоскліве, нежели на лісномі медвіді; ноги сілоди покрыты густою шерстью; ходиті по сухому пути и плаваеті по воді, ны-

C 4

ряеть.,

ряеть, и носимь бываеть по Октану на льдинахь; берлоги дълаеть въ снъгу; питается
рыбою и другими въ Октанъ плавающими
тълами, также падалищемъ, выкидываемымъ
на берега. Родять по одному и по два. Промыніляють ихъ Самоъды стръляя изъ глуковь для шкурь, а мясо ъдять.

23. Барсукъ, Язпецъ, величиною съ дворовую собаку; но станомъ длиниве, толще, и на ногахъ ниже; голову имъетъ продолтоватую; рыло в упое: нижняя челюсть короче верхней; ноги какъ у медвъдя; шерсть на спинъ сърожелтая, подъ брюхомъ и на лапахь черная, на головь оть рыла вдоль чрезъ глаза до ушей простирается въ объ стороны по черной полось. Находится вы льсахь, обитая по норамь и щелямь, вь коихъ проводить весь день безвыходно, а за добычею тоняется токмо ночью. Питается разными лесными плодами, лягушками, птидами и другими по своей силъ звърями. Къ осени отжиръваеть чрезвычайно, на зиму ложится спать вы норы и тогда сосеть не лапу, а жиръ изъ находящихся подъ хвостомъ жельзокь. Бъгаеть весьма нескоро такъ

чшо

что и человъкъ почти догнать можетъ, кольми паче собака; нагнанный ложится тот-часъ на спину и защищается когтями и зубами. Приносятъ по четыре и по пяти весною. Ловять его собаками и стръляють изъ ружей, или вырывають изъ норъ молодыхъ, коихъ приучають за собою бъгать вмъсто собаки. Шкура его по маловажности своей употребляется на обивку сундуковъ и другія мълочи; мясо можно ъсть; жиръ употребляется въ аптекахъ.

24. Россомакъ, похожъ на Барсука, но терсть имветь на спинь сердцеобразно черную, по бокамь рыжую; ноги и рыло черное позадь же глазь около головы сърую полосу. Находится вы густыхы лисахы, IINтается зиму и лъто оленями, зайнами, тетеревами, также падалищемь, и при томь всегда вы товариществъ имъеть лисицу; ко--гда онб видить большаго звъря, который или убъжать или ему противиться можеть, то взбирается на дерево, съ которато кидается на его и завдаеть. Родять въ Маїв по два и по три въ самыхъ укромоннъйшихъ и неприступнъйшихъ мъстахъ. Подъ старость

роспь теряеть онь зубы и тогда питается токмо муравьями, отв чего у его шкура, впрочемь дорогая, двлается негодною. Ловять ихь стрвляя изь луковь, или капканами; гоняють также собаками; но сы сими или онь управляется, или обезсильвы изпущаеть изь себя такую вонь, что собаки отступить оть его принуждены бывають,

25. Ежь, зверокъ небольшой, покрытый сверку вибсто терсти толстыми, колючими и перепутавтимися иглами и только поль и па ногахћ имветь жесткую боюхомЪ персть. Водится около перельсковь вы норахъ, зделанныхъ изъ мха; ходитъ по ночамь: пищается мышами, птичками, лягушками, насекомыми и всякимь падалищемь; не нападаеть, какь на нижшихь себя и не защищается от сильньйшихв, какв свертываясь вы клубы, изы котораго не прежде развертывается какв положенный вв воду. Родипр по при и по пяти, всъх уже св иглами, но мягкими; в домажь привыкаеть очень скоро, по чему и держать его нъкотюрые для изтребленія мышей, но npo.

производимый имъ опъ хожденія по ночамь по полу дълаеть его покоющимся нетерпи-

26. Кротя, земляной Сустака, нежожь терстью на черную мышь, по рыхо длинное, острое; глаза въ шерсти едва видные; ушей не видащь; хвость короменькой; ноги короткія, пашицалыя, переднія широкія, несьма сильныя съ кръпкими ногинями. Водится по лугамь и низменнымь мъстамь, тав соется подъ землею насыпая сверху земляныя кучи. Питается червяками, кореньями. Носять по четыре, и по пяти, коихъ родять подъ нарышою выше прочижь и внушри пустою ку-По, наносимому от в них вреду в садахь и огородахь, также и по лугамь, занимаеть онь многихь домостроитсям, какимь бы образомь легче изтребить сте животное; силки, западни, отрава, все мало пользусть; наводненте штх в мъств всего лучше, но и при ономь выплывающь онь до вышних в мьсть, вскаранкивающся на дерева и проживающь, пока вода сбуденть. Вь Сибири множествомь своимь составляють они взжалымь собакамы -од бхи каомы зидотонан в свидом йінтек, Вольное

вольное количество изв шкурокв дёлають легкие и красивые мёхи.

27. Выхужоль, внешнимь видомь похожь нъсколько на сърую крысу, но станомъ толще и кругаве; рыло острое продолжается вь хоботокь, подь которымь имъется роть; глаза маленкіе; місто ушей означають маленькія бъленкія пятнышка; шерсть дымчатая, подъ брюхомъ сърве; ноги голыя, соединенныя перепонкою; жвость голой, чешуйвершикально плоской; водишся по Волгъ и Дону, въ средней полосъ Россіи, въ берегахь рыкь и озерь, вы коихь роешь себы норы изъ подъ воды, въ которую ходить для ловленія водяных в, насекомых в, червей и піявиць. Ловять его сттьми и вырывають изь норь для употреблентя шкурокь на опушки, а хвость, какь чрезвычайно пахучій, кладушь вы плашье и ружлядь для оштнанія моли.

Примвианіе. Всь сій животныя отв номера і до 28 суть хищныя, питающіяся мясами другихь животныхь, и по тому какь ногти, такь и зубы вь верхней и нижней челюстьи

мелюсти имъють многіе, острые, а сверьхь того по сторонамь клыки, коими рвуть.

28. Крыса, вредное въ домостроительствъ и отвратительое животное, водится около жилых в мъсть, по по гребамь, старымь домамь, около магазейнь и другихь мъсть, гдв вв неприступных ущелинахв себъ гнъзда, въ коихъ выводить по больной части льтомь, и при томь не одинь разь, по пяти и шести крысенять; сіи прежде неженачнуть выходить изв гивздв своижь питаются изв запасу, нанесеннаго предв родами машкою, кошорая вы оную сносины все, что ни попадеть, даже металлическое, котораго всть не льзя. Питается всячиною изъ прозябаемаго и животнаго царства, такъ что неръдко ражиножась в какомъ нибудь мъсть чрезвычайно, угнътаемыя гладомъ нападають на обыкновенных в мышей и другь на дружку, и пітьмъ сами себя изтребляють. Для избъжанія вреда наносимаго ими и занасамь и строенію изтребляють ихь отравою, пастыми и кошками, но сій нерфдко требуются, чтобъ были нарочито сильны и умьми съ ними ладишь. Опаснъйшій ихъ непріятель

пріятель горностай и ласка, а по том'ь совы и другія хищныя птицы.

Примінайне. Крысь есть многія размичія, которыя состоять вы цвыть ихы шерсти и мысть житія; примінательные чернам и былая крыса, поменая крыса, которая еще болье домовой; подяжаю крыса, и проч. Всы сій суть жители Европы и вы другія части свыта завезены, сказывають, не иначе какь на корабляхь.

жожа на крысу, выключая что гораздо меньте, цветомь всегда дымчатая, (хотя за
редкость поподають иногда и белыя) и
нравомь боязливе. Обитають токмо вы покояхы поды поломы, за обоями и проч. Питаются всякимы сыбстнымы запасомы; пьеты
свою мочу; вы прочемы всемы сходствуеты
св крысою. Кы сей многіе не столько отвращенія имыють, сколько кы крысы и для
того содержаты для увеселенія своего живыхы вы банкахы, но она никогда совершенно
не привыкаеты. Кошка ся природный не-

примьчаніс. Маленькихь мышей сето рода, ралинествующихь інерстью и имъстомь житія, есть множество; инныя водятся вь льсахь, другія є горахь, степяхь,
лугахь, по пашнямь и проч. Примьчательные
изь нихь Сибирская мышь; которая, будучи
высомь меньше полузолотника, составляеть
мальйшее вь сосцекормящихь животное.

30. Автучая мышь, Нетопырь, Кожань; ихь великое множество различій и мышью названы по сходству токмо одной терети. жоши вь прочемь живошное совсемь не мышинаго рода. Она примъщна наипаче тъмв. что передних в лапь длинные пальцы, будучи соединены пространною перепонкою, сообщаются св задними ногами и хвостомв, посредствомь чего живопиое можеть по воздуху льтать (но уже неходить и не бытаень по земль) какъ птицы. Обитаетъ она въ лъсахь по дупламь, вы пещерахь, по колокольнамь и другимь высокимь зданіямь; видить и льтаеть только ночью, а днемь ни того ни другаго дълать не можеть, Питается ночными бабочками и другими по ночамъ лътающими насекомыми; на зиму собираются

ракотся многія вмъсть въ одно пустое мъсто, тдъ пребывають чрезь всю зиму едва дышущія. Ни вреда, ни пользы оть нихь ньть, а ловять иногда для любопытства разославь бълое полотно, на которое она садится, или разведши огонь, около на котораго льтающихь быють палками.

13. Пеструшка величиною съ посредственную крысу, но шерстью сърожелтоватая съ черными неправильными на спинъ пятнами и хвость коротенькой, волосистой. Находится болье въ Съверныхъ странахъ Сибири; питается ягелемь и кореньями друтихь травь; роеть норы, вы коихь свивь ғньзда из мжа рожаеть по три и по четыре мышецка. Удивительные всего вы семь маломъ живопномъ, что оно переходить въ извъстные годы изъ страны въ страну и чрезъ нъсколько льть опять возвращается; для сего собираются онъ многими тысячами вмъств, идуть вы надлежащую имы страну на востокъ или на западъ большими стадами, следуя одна мышь за другою и напрявляя пушь свой по прямой линфф, одна кЪ другой почти параллельно, такъ что тропинки множесптвомь

жествомь шествующихь, хотя нетяжелых живошныхв, видны пробишы на два пальца глубиною. Мышей сихъ шествуетъ иногда такое множество, что въ длину и ширину занимають собою великое пространство и нъсколько часовъ надобно дожидаться, покудова земная сія туча пройдеть; по чему жители съверных в странь увидя необычайное около себя множество сихъ пеструшекъ, почитають, что онъ сь неба съ дождемъ спадающь, но не безпокоются оть того, по тому что онв имъ вреда не наносятъ, а за собою прибыльный промысель другихь пушныхь, ими питающихся звърей приводять. Вь пути ничто ихь остановить, ниже что съ пуши совращить можеть: ръки, озера и самые морскіе заливы покушаются онѣ переплывать впрямь нередко съ конечною своею погибелью; случающіяся на водъ суда перепалзывають черезь; свиные стоги и тому подобное, что прогрызть можно, протдають насквозь не сворачивая съ прямой своей дороги. Встръчающіяся большія каменья, кои ни вскарапкаться, ни подъ нихъ подкопаться не могуть, обходять вокругь и на

другой сторонь начинають продолжать путь свой далье прямо противь того мьста, сь котораго обходить, принуждены были. Однимь словомь вы маленькомы семы животномы примычается удивительныйшее свойство. Для безвредности ея и причиняемаго богатаго лову песцовы, лисицы, горностаевы и прочихы, кои за ними гоняются, сами онь оты нькоторыхы народовы паче почитаются, нежели промышляются; шкурка ихы годится на красивые мыхи, но онь непрочны.

33. Сусликт, Епрашка, величиною съ вышеписанную пеструшку или немногимъ болъе, но
видомь красивъе; шерсть имтеть сърожелтоватую съ темными по всей спинъ копъичками.
Водится по всъмъ полуденной Россти степямъ
и открытымъ полямъ, обитая въ глубокихъ
вертикальныхъ норахъ, въ коихъ просыпаеть
всю зиму, а на лъто выходить изъ оныхъ
и съдши на заднтя лапки свистить тонкимъ
и проницательнымъ пискомъ. Питается кореньями луковичныхъ травъ, а въ заселенныхъ мъстахъ и огородными плодами, чъмъ
наипаче вреденъ бываетъ въ заселенныхъ по
Днепру

Днепру мъстахъ. Красивая его шкурка у нъкоторыхъ только (вошла во вкусъ, для которой его иногда и промышляютъ силками, а болъе выливантемъ изъ норъ водою.

33. Хомакъ, Карбушъ, подобень Суслику. но шерстью рыжій сь желтыми на щекахв и плечахъ пяпнами и чернымъ брюшкомъ и лапками, или весь черной, который однако ръже первато. Водится въ тъхъ же странахъ, гав и Сусликъ, но на мъстахъ болъе поемных и лугахь, тав рость себв глубокія вертикальных норы о многих каморкахв. изв коихв одна всегда бываетв полна запасомь, состоящимь изь разныхь травь, луковиць, гороху и проч. Для переносу сего запаса св поля вв нору имъешь онв у за щеками особливые мешечки, кои, натвшись сперва самъ на мъстъ, набиваетъ такъ, что толова у него становится толіце самаго туловища. Шкура его можеть служить на легкие и недорогие мъхи.

34. Строкь, Байбакь, величиною сь Кошку, а неуклюжностію своего тьла похожь на медвъженка; шерсть имъсть сърожелтоватую; ушки круглыя, коротенькія; жвость

небольшой волосатой; ноги почти голыя. Водится вы полуденной Россіи обществами, двлая себв пространныя и глубокія норы о многих в каморках в и выходах в на холмах в. на коихъ обыкновенно въ ясную погоду лътомъ (ибо зиму всю просыпаеть) гръется на солнцъ, либо сидитъ на заднихъ лапкахь, и какь скоро увидить издали проъзжающаго, то свистить громко и даеть прочимь, особливо своимь молодымь, знашь, чтобь убирались въ норы. Питается разными раствніями, а привыкшій в дому жавбомЪ, молокомЪ и плодами; пищу свою береть всегда въ переднія ланы. Носять по три и по четыре; живуть по девяти и болве льшь. Промышляють его осенью пастьвырываниемъ, выливаниемъ ихъ норъ и пешлями для шкурь, кои походящь шокмо на опушки простых в тулуповь, и для жиру употребляемаго въ домашнія лекарства.

35. Тушканчикь, Земляной зайч кь, теломы похожы на Крысу, но цевть шерсти стробыми, а поды брюхомы былый; зубы такы какы у всего мышьяго рода вы верхней и нижней челюсти переднихы по два; уши длин-

длинныя, острыя; переднія ноги коротенькія. а заднія весьма длинныя о прежь пальцажь. и хвость втрое противь туловища длиннъе, волосатой и кончащися шишмолкою Водится въ полуденныхъ степяхъ России и Египтъ. Рость себъ въ пескъ норы, изъ коихъ выходить токмо по ночамь для снисканія цветковых луковиць, коими питается. По причинъ короткости переднихъ своихЪ ногЪ нихр хоне можеть онЪ на дишь, ниже приступашь, и для того держится всегда на двухъ заднихъ подпершись хвостомь, а когда бъжать надобно, то на сихъ двухъ ногахъ съ помострвляеть щію хвоста столь далеко, быстро и въ разчто никакъ его и никакимъ стороны, звъремъ изловишь не можно. Калмыки гоняютса иногда за нимъ на лошадяхъ съ плетьдля увеселенія и застегавь мясо ъдять.

36. Бѣлка, Вѣкша, животное величиною съ обыкновенную Крысу, имъющее на переди по два зуба; глаза больше, острые, черные; уши острыя съ длиными волосками; переднія лапы о четырехь пальцахь, служащіх

T

ей вывсто рукв, а заднія о пяти; жвость покрыть длинными и густыми волосами, разборомЪ на двъ половины; шерстью бываетъ двоякая; лъщомЪ рыжая съ бълымЪ брюшкомв, а зимою сърая. Водишся вь лъсахь зиму и лъто и вьеть себь гивзда въ дуплахь; сидить наиболье на заднихь лапкахь жвость держа всегда на спинь; питается оръхами, шишками, ягодами и другими сочными плодами, котпорые на зиму запасаеть, а когда вств, то береть ихв въ переднія дапки и сидя на заднихь гложеть; вь льсу скачеть съ дерева на дерево и не сходить съ онаго, как или вы бури, или гдв разстояние перескакивать далеко. По причинъ недостатка пищи вь одномь льсу переходить она всемь множествомь вь другой, и когда надобно переплывать озеро или ръку, то садится на корку, или другое пловучее тъло и тапри вътръ поднявЪ кимь образомь жвость переносится, куда ей надобно. Hoпри и до пяпи. Промышляющь сять по силками, или и шамарами, для рокъ наипаче зимнихъ, кои разбиваются на лобки, брюшка, хребшы и хвосшы; изъ коихъ первые

первые три походять вы мёхи, послёдніе на ожерелья, однёжь волосы на тушевальныя кисти и проч. Гнёзда ихь изыскивають для ихь запасовь. Лучшія Бёлки у нась Нерчинскія. Попадають также на рёдкость черныя и бёлыя. Живыя содержатся вы клеткахы для ихь красоты, проворности и невиннаго вида. Мясо ихь можно ёсть.

- 37. Бурундукь, немного поменьше Бълки, также и хвость покрыть не столь длинными волосами; щерстью сърожелтоватый съ пятью вдоль спины черными полосами. Водится также какъ и Бълка въ лъсахъ по дупламъ; питается оръхами, шишками и проч. кои всъ запасаетъ на зиму. Промышляютъ ихъ для шкурокъ на мъхи и для вынутія ихъ запаса.
- 38. Льтяга, похожа на Бълку, но шкура столь широка, что простирается еще между передними и задними лапами, посредствомъ которыя, разтянувъ всъ четыре ноги и жвостъ, перескакиваетъ съ дерева на дерево весьма далеко, однако всегда сверьху внизъ. Обычаемъ и життемъ какъ Бълка. Водится

въ Сибиръ по лъсамъ. Промышляется для шкурки на мъхи.

39. Заяць, Тушкань, величиною съ большую Кошку, имъющий передних в зубовь по два; уши длинныя съ черненькими кончиками, хвость коротенькой, загнутый къ верьху; ноги переднія небольшія, а заднія длинныя; всв онв свизподи одвины густою шерстью; шерсть на немь зимою вся былая, а лытомь сврая съ бълымъ брюхомъ. Водится по перелъскамъ и въ горахъ; гнъзда вьеть въ разсълинахъ и подъ колодами. Питаєтся корень ями, молодыми вышками, корою деревь и Носить во всякое врема по четыре и бхичист. по пяти заичонковЪ Звёрь ма боязливой, спить открытыми глазами но не видить какъ токмо со стороны; слышить мальший шорохь и сь логовища своего подымается, но гдебь ни бегаль, кв оному послѣ опять возвращается; бѣгаеть. весьма быстро, и при томъ скорве на гору, нежели наровномъ мъстъ или подъгору; на бъту виляетъ во всъ стороны, а если въ то самое время кинуть шляпу вверхв, то принадаеть къ землъ или кочкъ и думаеть,

что онь уже скрылся. Промышляется для шкурь, изь коихь делаются заичьи мехи; а сверьхы того шерсть употребляется вы дело шляны и на пряжу; мясо его едять. Живыми забавляются на псовой охоть. Не-пріятели сего боязливаго, плодущаго и ничего кромь ногь кы защищенію себя не имьющаго звъря суть всь хищные звъри и птицы.

Примвчанів. КЪ заичьему роду принадлежать: Кроликъ, который во всемь пожожь на зайца, токмо поменьше, нъжнъе и водится токмо въ теплыхъ странахъ. Сверхъ того въ Россіи есть много другихъ отличій; но ръже всъхъ попадаются въ Казанской Губерніи черные зайцы; другія мълкія породы, какъ то Съностанцы, Чекущки и проч. по безполезности своей не заслуживають вниманія.

40. Бобрь, звърь внъшнимъ видомъ похожій на Крысу, но величиною съ Барана, имъетъ напереди вверьху и внизу по два большихъ зубовъ; переднія и заднія лапы коротенькія, изъ коихъ у первыхъ пальцы раздъленные и служатъ вмъсто рукъ, а задніе соединенные кожицею для способнъйшаго по водъ плаванія; хвость большой, толстой, плоской,

на подобіє лопаты, сврый, чешуйчатый; шерсть густая, осистая, цвътомъ бурая. Водишся въ Сибиръ большими обществами вь льсахь при ръкахь и озерахь, гдъ вь берегахь роеть себъ пространныя норы о двухь выходахь, одинь подь водою, другой на сужой пушь, со многими отнорками для всей многочисленной своей семьи; а чтобъ вода всегда вь одинакой вышинъ стояла, строить всемь обществомь весьма искусно изв сваленных деревь плошины, кои перепушавь сучьями укрвпляющь каменьями, замазывають прочія пространства глиною и такъ выходя изб норб сидять при усть подводнаго выхода опусшя жвость въ воду. Въ строеніи плопины и норь своихь, къ чему онъ не имъють другаго орудія, кромъ зубовь и хвоста, превосходить Бобрь разумомь своимь встхь прочихь звтрей, хоппя впрочемь глупъ, смиренъ, непроворенъ, но силекъ, и вь домахь блудливь. По воде плаваеть скоро; на сухомъ пущи бъгаетъ тихо; состроивь норы живуть, сколь бы велико ихь общество ни было, между собою согласно, каждый самець и самка особо и бобрята особо. Бсе льто проводять или въ строении себъ

жили-

жилища, или въ заготовленти на зиму запаса, который состоить вы чурбанахы деревы, погруженных для всегдащней свъжести в воду, и корв. Носять по два и по три; живуть до двадцати льть. «Нромышляются собаками, пускаемыми въ верхней выходъ, которая его заставь вы гнъздъ вытаскиваеть на ружу, или стрвляніемь изв луковь, когда его водъ застануть, а чтобь и съ стрълою не ущель вы какую нибудь подводную нору, сыскивають его посль по привязанной къ стръль веревкъ, съ которою ее пущають. Польза от Бобровь главнъйшая состоить вь шкурь, которая употребляется на мъхи; шерсти на шляпы, чулки, перчатки и проч. въ зубахъ для лощения у золотарей; въ струйкъ для аптекъ; мясо, а намаче жвость и языкь, употребляють некоторые народы вь пищу. На ръдкость попадаются бълые Бобры съ красными глазами.

Примъчание. Всв си звъри от номер ра 28 по 40 называются Грызущими, по тому что онъ имъють на переди въ верхней и нижней челюсти по два только большихъ зубовъ, коими грызуть дерека и все прочее, чъмъ питаются; клыковъ же у себя не имъють.

### Опабление П.

## О колытныхъ зевряхъ.

### \$ 37.

Колышные зиври называющся щакіе, кои имфющь по конець ногь не пальцы, но одинакія или на нъсколько частей раздъленныя копыта.

## \$ 38

Они всв траноядные. Тв, у коих копыта раздвленныя, всв почти рогаты; передніе зубы имвють пюлько вь нижней челюсти, а вь верхней нвть; желу докъ имвють четверомвстный и таковые всв, выключая свиньи, жують жпачку.

#### \$ 39.

Сїй звъри составляють собственно кожепенные Россійскаго Государства промыслы и скотоподство, по чему воспитываніемь оныхь занимаются цёлыя области.

#### \$ 40.

# Извъстнъйшіе по своей пользъ

1. Лошаяь, Конь, знакомое всемъ животное; самень называется жеребець, самка кобыла, кладеной мёнень. Шерстью бываеть весьма различна. Находишся повсюду около человъка между пропиками и даже до полярныхЪ круговь, приученая изъ дикихъ, кои въ нъкоторых в местах В Азіи и Африки обретаются. Любить наипаче холмистые перельски, питается травою, носить вы годы по одному жеребенку; ролить и спить стоя; живешь до 30 и болье льшь. Каждый жеребець предводительствуеть своему стаду кобыль, коих в числом до 13 бываеть. Самыя лучшія по красоть и скорости бъга почитаются Арабскія, и Аглинскія; прочія по различію воспитанія вь каждой земль имьють всякая свои преимущества. Польза от лошади въ жизни состоить въ вздв на ней, въ работв, перевозъ тяжестей; по смерти въ кожъ, шерсти, гривъ, хвостъ и копытахъ, коихь кожу употребляють сыромятники и съдельсъдельники на разныя вещи, шерсть въ набивку инфаковъ, стульевь и проч. Грива и хвость на дъло волосяныхъ пуговицъ, ситъ, ткание на стулья волосяныхъ матери, смычки и проч. Копыта у гребенщиковъ и другихъ костяныхъ дълъ мастеровъ. Калмыки ъдятъ ея мясо и пьютъ молоко.

2. Осель, величиною тораздо меньше лошади и шерстью хотя бываеть также различень, но болъе съраго или дымчатаго цвъта съ чернымъ по жребту и плечамъ простирающимся крестомь; кромв того примътень алинными своими ушами и хвостомъ на коннь только косматымь. Впрочемь сходству еть во всемь сь лошадью, выключая нескладнаго своего вида. Водится въ умъренныхъ странахь, гдв употребляють его къ ношенію тяжестей; онь любить чистоту и лежать на солнць; вь работь хотя тихь, но терпъливь и ступь имъеть надежную, такъ что никогда не споткнется; вств умвренно и при томь самыя грубыя травы, какихь ни лошадь, ни рогатой скоть не принимаеть; пьеть только чистую воду; носить по одному въ годъ осленку; живеть до тридцати леть; защищается не лягая как в лошадь, но быеть переднею ногою. Вы жарких странах онь лошади, вы разсуждении разума и понятности, ни мало не уступаеть; вы умъренных глупьеть, а холодных совсемы не сносить. Польза оты Осла вы живы состоить вы работы и вы молокы, а по смерти вы кожы, изы коей дылается самый лучший шагрень.

Примвчание. Осель мышается сы кобылою и производить Лошака; жеребець сы ослихою Меска; оба си вновы не распложаются. Вы Сибири по Аргунской степи и вы Моголи находятся дикие ослы, называемые Джигилей: Вы южной Африкы есть роды ословы называемыхы Зебры, кои примытны тымь, что всы тыло ихы укращено темными поперечными полосами.

3. Велблюдь, звърь между домашними скотами самый величайтий и бываеть двухь родовь; одинь обь одномь на спинь горов, другой о двухь; оба принадлежать къ роду скотовь, кои, то есть, вы верхней челюсти переднихь зубовь не имьють и вмъсто тото десны оныя покрыты жесткою хрящеви-

ною, копыта раздвоившись и желудокъ разделенный на четыре от деленія, по чему жують жвачку. Велблюдь имъеть голову маленькую, безъ рогь, съ корошенькими ушами и раздвоенною верхнею губою; шея и ноги у него длинныя, а туловище толіциною въ бычье; внутри кромъ общихъ всъмъ скотамъ четырехъ желудка отдълени имъетъ еще пятый для запасу воды. Шерстью бывають рыжіе или буроватые. Водятся в полуденной Россій и других в жарких в странах в, гдв употребляется для взды и ношенія тяжестей, накладываемых вему лежачему на спину. Онв весьма силень, тягущь и долго вы безводных в степях в может в сносить голодь и жажду. При нагружении тяжестей онъ лежишь на коленкахь, и даеть на себя накладывань, сколько ему снести въ мочь; когда же видить грузь больше, то реветь; вы дорогъ идеть хотя ступью, но большими шатами; отдыхаеть мало и по тому переходинів великія разстоянія. Аюбинів разной стукъ и музыку. Питается разными самыми колкими правами и любить соль; пьеть много и напивается за одинь разь на нъсколько дней впередь; носять вы два года по одному велблюженку; живуть оть 30 до 50 льть. Сверхь того полезень вы домоводствы мясомь и молокомь для пищи, щерстью для камелотовь.

4. Кабарга, похожа станомъ на барана, но безъ рогъ и шея длиннъе, и если зубами, ногами, желудкомъ, сходствуетъ съ прочими скотами, то имъющимися (у самщовъ только) въ верхней челюсти высунувтимися на ружу клыками отъ нихъ отличается; шерсть на ней грубая, ломкая какъ у оленя, цвътомъ съробурая; хвоста нътъ. Водится въ Сибири по Саянскимъ хребтамъ и въ Китав. Промышляютъ ее для шкуръ на одежду, а больше для имъющагося у самца около пуна пузырька, наполненнаго пахучею жидкостью, называемою мускусъ.

Примечание. Вы продаже мускусь бываеты двоякий, либо вы мешечке, либо безы онаго; по дороговизне сего вещества часто для обману подмешивають вы него кровь самаго зевря, либо землю, либо другое что для увеличения тягости. Чистый мускусы должень быть сухой, запахомы крепкой м

даже несносный, цвътомъ темный, вкусомъ горькій, положенный на отонь долженъ сторьти, положенный на отонь долженъ сторьть весь безь остатку; нитка натертая чеснокомъ и продернутая сквозь его если лишится своего чесношнаго духу, то мускусъ чисть, если же удержить, то подмъщанъ; который продается въ мъщечкъ, тоть долженъ быть также сухой, кожицу имъетъ тонкую и волоски на оной темнобурые.

4. Олень, Самка же Лань, вышиною съ простую корову, но тоньше, выше на ногахъ и уклюжее; рога больше, ветьвистые, роняемые ежегодно; водится вы льсахы, питаясь травою, листьями, молодыми вътками, а зимою добывая изв подв снъгу можь. Носить по одному и по два теленка; живеть до 30 и болве лвшь. Звврь весьма легкой, быстрой и при томъ пужливой; какъ скоро услышитъ накой нибудь въ дали шумъ или около себя шорохв, топчась бъжить прямо на оный, а разсмотръвъ удаляется прочь, покудова увидить себя въ совершенно спокойномь мъ-Изловленные молодые содержатися звъринцахъ и они скоро теряють свою ди-На воль составляють или охоту знашзнашных в людей на вощадях съ собаками, или промысев наших в диких в народовъ для шкуръ на замшу и другія перчаточныя вещи, роговъ для клею, втучей соли и разных подълокъ, шерсти для набивки тюфяковъ и стульевъ, сала и мяса.

Примьчание. Въ Лапландии и по всъмъ съвернымъ тундрамъ находишся особлиный родъ Оленей, кои собственны токмо тамот шней странъ; но различие между ними состомить токмо въ шерсти, которая бываеть или бълая или бълосърая, и подъ шеею имъется висячая кожа, какъ у коровы, съ длинною терстью; рога плоскоконцые и когда идетъ или бъжитъ, раздвоенными копытами производить нъкоторую щелкотню; изъ оныхъ разведены у тамошнихъ народовъ величайти стада дворовыхъ, кои, сверьхъ того что составляють домашний скоть, возять тяжести, и слъдовательно замъняють и лошадъ и корову, кои въ тъхъ мъстахъ не держатся.

6. Лось, Сохатой, величиною съ лошадь, но шея не столь широкая, а кругловатая; го-лова большая, ноздри и роть пространной; уши больше; туловище пузатое, ноги длин-

ныя и тончавыя; терсть желтосврая, подь брюхомь бълве. Рога, у самца только, выходять изв головы ежегодно короткимь стеблемь и послъ разпространяются горизонтально на выходящие погодно сучки. Водишся въ съверных в лъсах в; питается правою, листьями и корою деревь; носять по одному; живущь до 40 льшь и болье. Звырь хотя пужливый, однако въ нуждв защищается рогами и передними ногами такъ, что не ръдко гонющихся за ними собакъ и поранившаго несмершельно охотника штыб либо другимь убиваеть до смерти. Промышляють его наиболье заганивая вь петіли, или спрвляя по такому месту, гдебь кожа была тоньше, иначе пуля его не скоро свалить, или гоняя съ собаками по насту для шкурь, упопребляемых вы войскъ на перевязи, портупеи и проч. роговъ и мяса, употребляемыхь какь и оленьи.

Примьчание. Въ Россіи, наиначе въ полуденной, находятся еще и другіе звъри изъ оленьяго роду, какъ Маралы, Дзерны, но они образомъ своего житія и пользою сходствують съ сими, коими наиначе у насъ производится торговля.

7. Козель, Самка же Коза, величиною събарана, но сшаномъ не шакъ круголь, какъ оный; шерстью, которая болве походить на волось, бывають различны. Онь принадлежить къ домашнимъ скотамъ (§ 38). Водится въ умъренных и теплых странах питается молодыми вътвями, корою, листьями, мхомъ и прочими травами. Собственно Козлу, что онь вь извъсшное время воняеть псиною; Козы носять пять месяцовь и рожають оть одного до трехв козленковв; живутв до 10 и 12 леть. Зверь бодливый, своенравный, гулливый, ни дому ни хозяина своего не знаеть, любинів бродинь и скакань по горамв. Ихв содержать цълыя стада, какъ для молока, такъ и для мяса въ пищу, сала свъчь, шерсти въ дъло разныхъ матерій, кожи, изъ коей дълають наилучийе сафьяны.

Примвчание. Въ Сибири на Саянскихъ хребтахъ находятся Дикие козлы, похожие во всемъ на домашнихъ. Сверьхъ того въ полуденныхъ степяхъ имъются сюда же принадлежащия Дикин козы разныхъ породъ, изъ ко-ихъ славнъйшия между Дономъ и Волгою, изъвъстны подъ общимъ имянемъ Сайга. Бъ Ана-

толін около Ангоры примѣчательны Козы по длинной и шелковидной своей шерсти, которая есть самая лучшая для дѣла хорошихъ шерстяныхъ матерій.

8. Барань, Самка же Опца, кроткое животное; водится в умъренных и теплых странахЪ гдъ составляеть большія стада домашняго скота; питается мягкою травою; носить пять мфсяцовь; рожаеть по одному и по два ягненка; живеть до 12 льть. Животное глупое, слабое, въ жизни своей подверженное многимь бользнямь от пищи, дождя, холоду и зною произходящимь; любишь соль. Некладеной называется просто бараномЪ, а кладеной сколець. Разводится нарочно большими стадами для снятія ежегодно по два раза шерсти для дела суконь, которая белая есть самая лучшая; по томь для кожь на обувь, мяса въ пищу, сала на свъчи, и кишокъ, изь коихь делають струны; вы некоторыхь земляхь овець дояпь льтомь дважды, а зимою однажды, и изъ молока дълають сырь, масло, равно какъ и изъ коровьяго.

Примъчание. Между баранами бывають безрогие, а инные попадаются от трехъ до щести

шести роготь имъюще. Славнъйше въ свъть для ихъ шерсти Бараны суть Ишпанске и Аглинске. Въ Азги и Африкъ есть Бараны съ долими и толстыми хвостами; у насъ въ Киргизахъ находится порода Баранопъ съ толстыми и коротенькими хвостами, кои называются курдюками, наполнены салотъ и въсотъ неръдко бывають по цълому пуду. Въ полуденной Сибири въ горахъ водится родъ Дикихъ баранопъ, кои наипаче примъчательны превеликими своими завитыми и весьма тяжелыми рогами.

9. Быкь, Самка же Коропа, животное вы домашнемы скоть извыстныйшее и наиполезныйшее изы всыхы, собою тяжелое, сильное и сы виду будто дикое; водится во всыхы странахы свыта, но поды разными климатами разной величины. Питается всякою травою; наывшись ложится жевать желку; носить чрезы девять мысяцовы по одному и рыдко по два теленка; живеть до 30 и болые лыть. Разводится для чрезвычайной своей какы вы жизни, такы и по смерти пользы, и сти Нум. 7, 8, 9, составляють прямо скотоводство, богатство цылыхы народовы. Некладеный бываеть свирыть, неручень и полезень токмо для разводу. Кладеный сильные, поводливве и употребляется до жани льтв въ тяжелую работу. Корова до двадцати льть можеть доить молоко, также работать, носить телять; всь же вь жизни еще полезны своимъ для удобрентя Пашенъ нужнымь навозомь. По довольной вь плугу работв откармливають на убой для мяса, кожи на обувь, сала, шерсти для войлоковь и сермяги, роговъ для гребней, кишокъ для золотобитовь, пузырей на фонари и стельки, костей на разныя костяныя вещи и проч. такъ что нъть ничего въ рогатомъ скотъ, чтобь не было въ домостроительствъ употребительно, и даже и самые оскребки, обръзки, от кожь, роговь, хрящей, сухихь жиль, копыть и проч. все смышавь вмысты вареніємь дають толь нужной и столь много употребительной шубной клей.

Примвчаніє. Лучшій рогатый скоть у нась Украинскій, по тому что крупнье, извъстный подь именемь Черкаскихь воловь, и Колмогорскій. Вы полуденной Россіи имъются такь называемые Буйполы, шерстью обыкновенно черные, рога имъють врознь, собою

собою сильные еще воловы; они любять лежать вы воды. Вы Индіи, Персіи и другихы жаркихы странахы находятся Дикіе быки, называемые Урусы, оты коихы безы сомныйя произошли домашніе.

### Примъчание на Рогатый скотъ.

Скотоводство и землепащество сопряжены между собою столь теснымь союзомь, что труды хозяина, употребленные на то, либо другое, награждаются обоими: хорошія поля кормять скоть, скоть удобряеть поля. Разподять у себя хорошій скоть мъщаніемь породь и при томь для лучшей удачи изъ мъсть либо сосъдственныхь, либо подъ одною широтою лежащихь. Содержать хорошій скоть сверьхь надлежащаго корму наблюдая: І чистоту вы клевахы, которые сверхы того иногда окуривать должно; 2 мытте скопины опть времени до времени и чесание; 3. мазаніе роговь и копыть масломь; 4. поставление соли для лизания; 5 спрыскивание съна виномъ и уксусомъ, и проч. Рогатый скотъ подвержень падежу или заразительнымь бояванямь, кои по большой части рождаются

отъ зараженнаго изъ падалицъ, легкими болъзнями причиненныхъ, воздуха; размножаютися дурною пищею и нерадънчемъ: такимъ образомЪ причина заразЪ изтребляется убираніемь мершвыхь скопинь сь полей; начало появившихся предбупреждается кровопущаніемь до двухь разь, клистирами и заволокою; пробовали неоднокрашно, и не безЪ успъха, предохранять здоровый скоть оть заразы прививаниемь оныя; успъхи бользни пресъевнотся отдълениемъ вольного скота отб здороваго, лъченіемь разными средствами, смотря въ чемъ бользнь состоинъ, описанными особо въ економическихъ книгахъ, закапываніемь падшихь, такь какь и встхь вещей къ онымъ прикасавшихся, глубоко въ землю.

10. Боропъ, Спинья, звёрь дворовый, по раздвоенным копытамь хотя причисляется къскотамь, но зубами, кои въ верхней и нижней челюсти имъются, и сверьхъ того большими клыками, также не имънгемъ четверомъстнаго желудка и не жевангемъ жвачки отъ отличенъ; собственно свиному роду предъ всёми сухопутными звёрями имъть подъ

подъ кожею вокругъ всего тъла слой тука повсюду, въ теплыхъ стра-Находится нахь гр сольшемр вр холодныхр вр меншемр Питается плодами, кореньями, количествъ. вырывая изЪ земли рыломЪ, и всякою сочною пишею изб животнаго и прозябаемаго царства, также и самою нечистью. Носять четыре мъсяца; рожають отв щести до двадцати поросять; живуть до 20 и льть. Звърь глупой, сонливый, малочувствительный, любить спать на солнув и валяется вь грязи; раздраженный опасень своими клыками. Разводится въ прилъсныхъ стахь; откариливаются нарочно желудками для своих в тушь, которыя разбиваются на окорока, лопашки, ребра, брюха и проч. Тукъ или сало обръзывается особо; кишки на дъло колбась и сосисокь; щетины на щетки, клыки для лощенія, вь торговль имьють свое мъсто; кожи пробовали выдълыващь, такъ какъ прочихъ скотовъ, на обувь и прочія надобности.

Примвчание. Вы полуденной России вы камышахы водятся Дикия спины или Кабаны, кои оты дворовыхы отличны чернострою своею щетиною.

#### Отавленте III.

## О Ластовых в звъряхъ.

#### \$ 41.

Подъ именемь Ластопыхъ разумъются величайнія животныя, имьющія наружный образь рыбы, но безь чешуй, и вмісто чогь изь плечь выходять небольшія, сросшіяся изь пальцовь ласты, а заднія ноги, сросшіяся вь мій къ, представляють горизонтальный хвость (§ 13, 20.)

## J 42.

Онт вст обитають вы пространныхы моряхы плавая по итскольку минуть вы водт, а послт выходя на поверхность для перемежентя дыхантя; питаются или другими животными, или морскими травами. Родять на сухомы пути или на льдинахы по одному и по два. Онт составляють роды такы называемыхы Китопы и приметны наипаче своею на лбу скважиною, или дыхаломы, посредствомы коего выбрасывають захваченную ртомыходу вверхы на подобте фонтана.

## Славнъйшие въ России Ластовые или Морские звъри.

Т Настоящій Кить, наивеличайшее изв всвхв на свыть животныхв, простирающееся въ длину отъ шести до десяти и болве сажень, съ соразмврною оной толщи-Голову имфеть почти треть всего твла занимающую, вы которой глаза малень. кіе, роть большой, вь коемь вивсто зубовь роговыя полосы, извъсшныя подъ несправелливымъ названиемъ китопыхъ усопъ. Прочее твло покрыто гладкою, бълвсоватою и слизкою кожею, подъ коею находится претолстый слой тука. Обитаеть въ Съверномъ Октанъ, самыя величайштя около Гренландій и Шпицбергена, питаются сельдями, морскимъ киселемъ, раковинами и другими червями. Рожаеть по одному, коего питаеть имъющимися вы пахахы двумя соспами. Животное величиною прочимъ сколь ни страшное, но незлобивое и лишенное почти всякаго къ своему защищентю орудтя. Онъ плаваетъ весьма быстро посредствомъ -новидон-

горизонтальнаго своего жвоста, коимъ изъ подъ себя воду попираетъ; имъже и защища. ется стараясь непріятелен своих в поразить ударомЪ. Непріятели его суть всв прочіе китовато рода звъри, собою хотя меньште, но гоняясь за нимъ множествомъ умучивають такъ, что онъ изкусанный обагривъ кровію великое моря пространство и изпуская престрашный ревъ наконецъ разтягивается и отворяетъ имь роть, чтобь языкь его вывдали, котораго они текмо и ищуть. Промышленики разных в народовь вздяшь в Свверное море за промысломь оныхь сь носками, и убивь вырезывають только китовый жирь на жжение, на очищение свры, въ примъсь къ корабельной смоль, на мыльные заводы, для выдълки кожь, и усы для корсетовЪ, а прочее за великостію своею кидають вы море; изы одного большаго, или двухъ средственныхъ Китовъ можно нагрузить жиромъ цълое купеческое судно.

Примвисние. Въ нашемъ Съверномъ моръ есть другой родъ Китовъ, называемыхъ у
Архангелогородцовъ Коростяными Китами,
которыя походятъ во всемъ на вышеписаннаго, но меньше и на спинъ, ближе къ хвосту,
имъютъ

имъють жирное перо. Кромъ того втръчаются иногда Киты съ превеликими головами кончащимися отрубомъ, имъющими толстые зубы токмо въ нижней челюсти, кои извъстны у другихъ народовъ подъ именемъ кашалотопъ.

- 2. Делфинъ, Морская спинъя, величиною въ сажень и болье; цвътомъ на спинь черная, подъ брюхомъ бъльсоватье; зубы
  во рту имъетъ въ объихъ челюстяхъ и на
  спинъ жирное перо. Находится во всъхъ моряхъ плавая стадами; питается рыбою, черьвями и другими мертвыми морскими тълами.
  Звърь жищный, проворный въ плаваніи и для
  Китовъ наизлъйшій врагъ.
  - 3. Однозубь, величиною вдвое и втрое больше и толще Делфина, а въ прочемъ по- добень. Примътень наипаче торчащими у него изъ верьхней челюсти прямыми, витыми, сажени по полтары, зубами. Водится по большой части около Съвернаго Мыса, гдъ питается обыкновенно сельдями. Зубы весьма хороши въ костяномъ дълъ; впрочемъ польза отъ всъхъ сихъ ластовыхъ животныхъ одижаковая.

#### Прибавленте.

# О славивишихь Иностранныхъ звъряхь.

1. Обезьяна, Мартышка, строеніемь тела и разположениемь частей во всемь почти подобна человъку и больше видомъ и подробнымь сравнениемь, нежели собственными примътами от онаго отличается. Ихв извъстныя разныя породы простираются до 40; инныя изв нихв безхиостыя, похожія во всемв на человъка, другія съ коротенькими жпостами, инныя съ долгими и при томъ площимися, другія непіющимися; наибольшая изЪ часть съ бородами. Безхпостыя по большой части ходять прямо на двухь заднихь ногахЪ; съ хпостами же становятся на заднихЪ а бъгають по ровнинамь и на однъхь заднихъ и на всъхъ четырехъ; казять также по деревамъ, прыгають съ дерева на дерево, къ чему у нихъ мускулы въ рукахъ, ногахъ и хвоств весьма здоровы. Всв сидять прямо; сидя дремлють согнувшись; спять свернувшись на бокъ или протиянувшись. Проснувшись бывають вь безпрестанномь движеніи.

женій, либо разкаживають, либо лазять сь дерева на дерево, все осматривають, все тевелять, либо чистятся, ищутся; вообще всв обезьяны блудливы, сердины, злопамящны, дразныливы, крикливы и дикія въ льсу своимь обществомь опасны; все, что ни увидять вь глазахь ижь блестящее, имъть у себя въ рукахъ желають, а удовольствовавшись овуть и бросають; все, что ни увидять вь дълающемь человъкъ, перенять стараются. Прямое ихв отечество вв старомв и новомъ свътъ между поворошными кругами, гдъ обитають онъ въ пространныхъ, лъсахъ обществами, однако порода съ породою не мъщается. Питаются наиболве изъ прозябаемаго царства плодами, листьями, по чему нервако обкрадывають у Индвицовь садовые и огородные овощи; также раззоря. ють жижины, вы коихь съвстной запась жранится; инныя вдять морских раковь и устриць. Всякую пищу сидя беруть руками, и поднесши ко рту сперва понюжають, а но томь вдять; пьють воду, молоко, вино и пиво; всв сій жидкія швла для пишья черпавоть горстью. Производять разныя разно, omb

оть одного до трехв. Кормить грудью и молодыя держанися за мань такь крвико. чито и на побътъ не отваливаются. Ловяшь ижь живыхь разными образами кь подражантю поставленными, а других стрвляють. Живыя употребляются вы домахы для любопыніства; инных приучають служить и разнымь мълочнымь искуствамь; нъкоторыхь держать вы техь местахь вместо собакъ для охранентя дому; многихъ въ Африкъ Вдять. Изв нихв примвчанія достойньйшій есть: Сотирь или Орангутангь безжвостый, во всемь похожь на человъка, а только что весь въ шерсти и приваживаемые въ Европу, можеть быть молодые, не болье аршина вышиною биели; но вы штяхь земляхь видали вышиною вь рослаго человъка. Находится вы необитаемых в мистах по темным в льсамв. одиначкою и обществами, на островахъ Явъ, Суматрв, Борнео, Бенгалв и всей знойной странт западной Африки. Питается травами, плодами, орвжами, раками и устрицами; спить на деревахь; ходить и бъгаеть на двухь ногахь весьма скоро; защищается кидая изь рукь камнями, или палкою, кулаками и зубами, и будучи сильны нервдко одольвають человька, а множествомь и самыхь большихь зверей. Изь сихь молодыхь многіе обучены бывали делать удивительный человьку подражанія; но говорить никогда и ни слова.

2. Авинпець, Ай; ихв известныхв токмо двв породы, кои различающся между собою числомъ пальцовь, у одного по три на нотахъ, у другато по два. Видомъ онъ походишь несколько на обезьяну, или на медевженка, величиною вы польаршина; станомы длинень, а ноги корошкія, у коихь пальцы сросшись, а ногти длинные, лежащие вывств плотно; шерстью сврой, которая похожа на оленью, груба, жестка, ломка. Находится вь жарчайшихь странахь полуденной Амери» ки. Обитаеть вы ласахы. Питается выпывями, листами и плодами разныхв деревь. Вь живопиыхь, кажется, сте есть бъдивищее натуры произведение, обиженное даже вы самыхь нуживижихь для содержанія себя на семь свыть средствахь; ходить: по неуклюжему строентю своего твла, не можеть вы вушки перейши больше семи, или осьми са-

жень, твыв трудные лазить на деревья, гды собственно его пища находится, и слазить сь онаго, когда на немь ничего не стало; питаться: переднихь зубовь, чьмь сощинывать, не имъсть, а только коренныя. Томясь такинь образомь голодомь и нуждою кидаться сь дерева объ землю, дабы послъ отдохнувь переползти ночью на другое ближайшее для своего насыщенія, проливаеть горькія слезы и кричить изо всего горла на шесть различных тоновь Ай; однимь токмо оть натуры награждень къ пущему своему мученію избыточно, живучестію, которая въ немь столь велика, что вырванное сердце вь. четверть часа не преставало биться, и онь нъсколько времяни еще живъ былъ.

3. Морской Демонь величиною сь Лисицу; примътень наипаче тьмь, что тьло его покрыто вмъсто шерсти черепахообразными кирпичнаго цвъта чешуями, которыя онь, когда осердится, подымаеть ертомь, а спасаясь свертывается въ клубъ. Находится въ Индіяхъ; питается муравьями, лягушками, ящерицами и червями. Промышляють его для жирныхъ хвостовь, кои употребляются въ пищу.

4. Татуй, звърокъ съ Ежа величиною, но вмъсто терсти или щетинъ на головъ, плечахъ и заду покрытъ костяными кожужами, посредствомъ коихъ свернувщись въ жлубъ безьопасенъ даже отъ пули.

5. Фараонская мышь, Ижнепмонь, звърокь величиною съ Крысу, головка тоненькая, остренькая, стань длинный, ножки коротенькая, жвость съ начала пушистый, а послъ къ концу тоньше; шерстью съренькая, въ прожелть. Находится въ Египтъ и Индіяхь около большихъ ръкъ и озеръ, гдъ питается всякими гадами, лягушками, ящерицами, змъями, мышами, а наипаче яицами Крокодиловъ, и тъмъ почитается избавителемъ тъхъ странь отъ вредныхъ сихъ гадинь; въ домахъ привыкаетъ какъ собачка.

б. Цибеть, звърокъ похожь на Кошку. но шея, толова и рыло длиннъе и остръе; шерстью сърой съ черными волнами и на жвостъ кольцами. Находится въ Индіяхъ, въ Китав; Мексикъ и по есъмъ Филиппинскимъ островамъ. Питается мълкими животными, птичками, звърками, рыбами и проч. Примъчанія достоинъ наипаче тъмъ, что

имъетъ у себя подъ жвостомъ желъзки, наполненныя дорогою, благовонною жидкостію, называемою Цибетъ, для которой наиболье животное, и дикое промышляется, и приученое у Голландцовъ нарочно воспитывается.

Дпуутробка величиною съ Листонка, также и цвътомъ шерсти красная, но ноги долгопалыя, похожи больше на руки, нежели на ноги; жвость длинный, полуголый. Находится вь жаркихь странахь, вь Бразиліи, Перу, и по Аншильскимь островамь. Питается растьніями, кореньями, насекомыми и разными червями, также птичками, но изъ нихъ пьеть только кровь, а мясо не вств. Животное сіе примъчательные по тому, что самка и мветь у себя брюко сумковатое, такъ что отверстве, вдоль по брюху простирающееся, можеть посредствомь нарочныхь къ тому мускуловь разширяться и свуживаться, а внутри представляеть пространство во всю величину брюха, на коемъ внутри сея сумы находятся сосцы. Обыкновенно сти животныя щенящь своихь не донашивающь и рожають прежде, нежели должно таковыхь родившихся донащивають онъ вы семь второмь ромь брюхв, гдв онв и питаются молокомь, покудова не выростуть большія, всегда оть непогодь и преследованій непріятельскихъ въ ономъ скрывающся положения

8. Дикобразъ, внъшнимъ видомъ, величиною и передними, въ вержией и вижней челюсти по два, зубами, сходствуеть съ обыкновеннымъ бобромъ; но жвость коротенькой, шерстистой, а на тель вивсто шерсти длинныя, какъ у Ежа, иглы, которыя онь, когда разсердится, посредствомь подкожнаго скула подымаеть ершемь, и иногда мускуль сжимаеть, что некоторыя иглы даже выскакивають. Находится Африкъ и Азіи; питается прозябеніями и древесною корою Незлобивый звърь защи-. щается свернувшись клубомь и выставя свои иглы не боишся ни кого.

9. Бегемоть, или Морской конь, звирь большой, неуклюжій, видь и лошади и быка, но при длинномъ станъ имъетъ короткія ноги, раздиленныя на пальцы; глаза маленькіе, зубы большіе, кожа голая, претолстая. Водишся при больших връках ВАзіи и Африки, вь коихь плавая очень быстро и ходя по дну Φ 超易

питается рыбою, а на сухомь пути срацынскимь піпеномь, кореньями и другими овощными прозябеніями. Звърь хотя цепроворной, но сильной, страшной и злой, такъ что самые лютые Крокодилы и Мокои его боятся; кожа на немь столь толста, что пуля не пробиваеть, а стръла только что отскакиваеть. Промышляють его однако Европейцы изь больтихь огнестръльныхь оружій, а Индъйцы длиными стрълами, наровя въ пахъ или другое мъсто, гдъ кожа тоньше, зубъ его не уступаеть добротою слоновому, только мълокъ.

10. Носорогь, величиною и строентемь тела похожь на Слона, только на ногахы ниже; толова подобна лошадиной; на носу большой, толова подобна лошадиной; на носу большой, толошой, конической рогь, а иногда два, одинь позадь другаго, иногда же на шиворошкъ выростаеть еще и тренти; копыть на ногахы по три; кожа на немы безы волось, толошая, складками по шев, позады плечы, по пахамы и по коленамы. Находится вы Африкъ и Индіи питаясь кустарниками, листыями, травою и разными плодами. Звъры сильной, смирной и только разыяренной на-

гда

тда прежде нежели напустить, рветь рогомы изы корней деревья и все что ни попадеть на дорогь. Акобить валяться вы болотахы равно какы и Слонь, по чему и нерьдко у нихы бывають за мъсто драки. Пользы оты него никакой нъть, кромъ что за нимы вздять на охоту, изы рогу дълають разные вы древности весьма дорого почитанные сосуды.

в ил. Слонь, величайший изв встхв сухопушных живошных вышиною до двухь сажень и немногимь больше длиною; чрезвычайная сія тромада стоить будто подперта ченырью столбами, каковые представляють у него ноги о пяти толстых в и коротких в пальцахь; большая четвероугольная голова едва примътно, что отв туховища отдъляется такою же толстою швею; вв ней тлаза маленькіе; уши пространныя; напереди жоботь, который ему служить для обонянія, дыханія, питія, бранія и защищенія себя; подъ хоботомь роть, изъ котораго торчать по сажени длиною, кь верху несколько загнушые, клыки, одинь по шу и по другую сторону. Все твло покрыто голою, претолстою, кое - гдв съ просядающими волосами

кожею. Находится вЪ Африкъ и вЪ Цейлонь по болошнымь мъстамь, гдь моется безпрестанно, опасаясь чтобъ кожа отъ жару не изтрескалась; питается молодыми деревь и кустарниковъ вътвями, плодами, травами и всякимъ хавбомъ. Въ разсуждении въка и рождентя его не извъсшно, по тому что около людей онв не размножающся, а поиманные приучающся всяких вогодовь. Ловять ихь всегда живыми заганивая въ ямы, въ петли межь деревь, или въ тъсныя мъста къ приученымъ самкамъ, гдъ выморя голодомъ ласкою и довольствомь делають изв него ручнаго, поняшнаго, на всв услуги за малое награждение всегда готоваго, при томъ добро и зло памятнаго; однъмъ словомъ изъ всъхъ живопных в кром в челов вка разумнишаго звъря. Употребляется для ношемія тяжестей и въ семъ случав онъ одинъ за двадцать добрых в лошадей служить. В инных в странахь Аравы жаять его мясо; другіе употребляють его шкуру на щиты и нъкоторыя домашнія надобности; жвость, у котораго только на концъ имъются волосы, употребляется богатыми людьми вмѣсто опахала-Полез-

Полезнвишая въ Слонв вещь есть его клыки, изь коихь художники делають толикое множество красивых и удивительных произведеній. У нась въ Сибиръ находится много слоновых в костей, вымываемых в изв земли водою, котпорая извъстна тамъ подъ именемь Мамонтоцой кости.

12. Лепъ, сильнъйшій изв всвяв жищныхв эвърей, принадлежащій къ Кошечьему роду, т. е. кои имъють у себя на ногахъ когти выпускные. Левь вышиною будеть съ годовалаго теленка, но станомъ длиниве, въ сажень и болве; дапы здоровыя, а когти кртпкіе, выпускные; голова большая, круглая, лице плоское, моршиноватое, угрюмое; около шеи (у самца полько) грива кругомъ, космащая и курчавая; хвость длиною до земли и кончится шишмолкою; цветомь серожелтый. Находится вы Африкъ по знойнымь пещанымь степямь, гдв отдыхаеть или разтуливаеть всегда спокойнымь духомь, когдажь увидить добычу, то припадаеть къ землв и ждеть покудова оная ближе подойдеть, и тогда съ нъсколька скачковъ напавъ сь маху убиваеть. Наввшись самь OCHIR-

are Pa

оставляеть добдать обыкновенно сабдующимь за нимь издали Каракаламь (родь Рысей). Когда осердишся, оскамиваеть свои зубы, морщить лобь, трясеть тривою, мотаеть и бьеть по земль хвостомь, и на конець ставь на заднія ноги, высунувь языкь, рычить чио есни мочи. Всв звври, выключая Слона, Носорога, Бегемотта и Тигра, страшатся его присущенивія; однако онь не нападаеть, какь когда голодень или раздраженный, а въ семъ случав не спущаетъ и человъку. Питается токмо живьемь, а не падалищемь или мершвечиною; следовательно Велблюдами, Лошадьми, Быками и другими симъ подобными звърями. Носить по четыре и по пяти левенковь. Живеть до 30 и болье льть. Промышляють его или стрвляя, или ямами. или украдывая у самки молодыхв, которыхв послъ воспитывають у себя. Польза от него состоить вы шкурв, которую употребляють на одежды, покрывала и другія надобности; вь мясь, которое оть Африканцовь почишается хучше телятины.

13. Тигръ, величиною подобень Льву, но не имветь на шей гривы и жвость безь шищмолки;

молки; шерстью сврожелтый св черными по всему твлу поперечными струями, а подв брюхомь бвлве. Находится вы Азіи, Персіи, Индіи, до самаго Китая. Питается также другими живыми звврями, на которые нападаеть вдругь св несказанною скоростію, и не спущаеть никогда и самому человьку. Звврь изь всвхв животных влютьйшій; нервдко видали, что поражаеть оны и самаго Льва; лютость его простирается даже до того, что не щадить двтей своих в, когда найдеть, и если матка защищать станеть, то и ее терзаеть. Промышляють его ямами для шкурв, изь коих в двлають весьма красивыя попоны и проч.

Примвчание. Прочие изв кошечьяго рода славнвишия звври сушь, леопорды и Барсы, величиною поменьше Льва и Тигра, но обычаями такиежь. Польза, но которой онв изввстны, состоить въ красивыхъ ихъ будто глазками изпещренныхъ шкурахъ.



## Классь П.

#### O ImnyaxI.

## \$ 44

Птицы суть такія животныя, коихы тьо покрыто перьями; роть состоить изы роговыхы челюстей; двв ноги для хожденія по земль, два крыла для льтанія по воздуху, жпость для управленія быту и польту. (По внутреннему строенію смотр. § 15).

## \$ 45.

Тёло их весьма легко, по тому что кости их весьма тонки, внутри наполнены мозговиною; толстыя мяса находятся только вы тёх тёстахы, гдв кы должайшему движению членовы требуються крычайшие мускулы; снаружи покрыто надутымы пухомы м разширенными изы тонкаго стебля перыями; все двлаеты их способными держаться на воздухв, а помавая крылами перельтать вы нысколько часовы цвлыя страны.

#### \$ 46.

Крыль у нихъ вмъсто переднихъ ногъ два, кои состоять изъ двоякой величины плавильныхъ вильных в перьевь, больших и малых в; оныя покрыты снизу и сверху мёлким в перьемы; сгибь, гдв большія плавильныя укореняются, представляєть кулакь. Ноги также двв, но у развых в разныя, вы разсужденій положеній ихь кы телу, длины, голости или мохнатости, числа пальцовь, положенія и соединенія оныхь, также ногтей. Хпость есть сердцеобразный конець туловища, называемый простю гузкою, состоящій изы двухь жельзокь, жирную влажность для смазыванія перьевь отдвляющихь, усаженный по всему внёшнему краю длинными для управленія польта перьями.

### \$ 47.

Прекраснъйшія животныя многоразличных цвътокь и голосовь, инныя днепныя, другія ночныя; обитають по всей земль, инныя на сухомь пути, другія на подахь; инныя пь льсахь, другія пъ горахь неприступимых і немногія однако собственно ограничены пребывають въ одной странь безпрестанню, а большая часть по временамъ года для пици перельтають изъ страны въ страну.

## \$48.

Пипаются инныя хищничеством других птиць и зверей живых в, другія мертвечиною; инныя травами, семянами, плодами, орежами и проч. Инныя насекомыми, раковинами, червями и проч.

## \$ 49.

Произподять себъ подобных вы нося вида (б 15), числомь, цвытомь, величиною различныя; внутрижь изь двухь быхопь и одного желтка состоящія, тонкою перепонкою и известковою скорлупою покрытыя, которыя насиживають вы гныздахь сами и вылучившихся изь яиць кормять разныя разно.


#### \$ 50.

Польза от птиць главный для человыка от приученых или дворовых , состоить вы ихы мясь, яицахы, нухы и перыяхы; другихы же содержать для рыдкости, красоты, либо для пріятнаго ихы пынія.

Примвисніє. Зная время когда и сколько дней какая птица сидить на яицахь, можно изь подь другихь, дикихь, того же или и другаго рода, класть, высиживать яица подь подъ домашнихъ; сте можно дълать со всъми ппицами, кои вылупившись из лиць бъгающь за машкою и сами себъ ищущь пищу, или вдять показанную маткою; оное есть самое лучшее для разведенія средство у себя птиць изь дикихь породь; когда же понадобится симь образомь выводить у себя иностранных птиць, то вивсто чтобЪ выписыванть ихЪ самихЪ, лучше старашься досшать оных свъжия яйца, которыя узнающся полносшию вы скорлупь и прозрачностію, и таковыя покрывь два или три раза лакомъ пересылать въ надлежащее мъсто, но чтобь разстояние не далве простиралось, какЪ дней на сорокЪ.

## Ŝ 51.

По роду их житій и місту пребываній, кі чему оні снабжены оті естества таковыми пищевыми и ходовыми орудіями, разділяются піпицы на шесть отділеній: на Хищныя, Соропыя, Водяныя, Голенастыя, Куряныя и Воробейныя.



## Отдъленте I. О Хищныхъ птицахъ.

#### \$ 52.

Хищкыми липидами называющся щакія, кои имфють у себя нось крюкомь или покляпой, и при томь на каждой сторонф вержней челюсти имфется по маленькому зубку, клыки сего рода птиць представляющему; ноги короткія, крфпкія, когти сильные, сьизподи тероховатые; ногти загнутые, острые.

## -th -the same as 5.53.

горамъ и дремучимъ лъсамъ. Питаются нападая на живыхъ звърей въ открытомъ полъ;
другія довольствуются падалищемъ. Гивада
пьютъ по неприступнымъ утъсамъ и на высочайщихъ древахъ; янца носятъ по три и
по четыре; вылупивщихся кормятъ принося
добычу въ гивада и растерзанную подавая
молодымъ въ носъ. Примъзанія достойно,
что въ семъ родъ птицъ самки, не какъ у
всъхъ прочихъ, крупнъе и красивъе самцовъ.
Польза отъ нихъ важнъйшая, что ихъ можно
приучать ловить другихъ птицъ и звърей.

### \$ 54.

## Славныйшія къ сему роду принадлежать Россійскія:

1. Черный Ореал, величиною съ Гуся; ноги и на носу переносье желшыя; перьемъ бурый сь желтоватыми подь исподомь вь длину пятнами. Водится по Уральскимъ горамъ и вь Сибири по дремучимь лъсамь.

Примвиание. Подобные ему величиною Орлы попадаются повсюду въ Россіи, наипаче по Волгв, но отличаются или цветомъ перьевь, либо цвътомь ногь и переносья, и по тому у степных в только народовь, кои ими диких върей и ппицъ промышляють, и имъють отличныя себъ названія, на прим: Беркуть, Карагучь, но неръдко сінжь именаи другимь Орламь придаются,

2. Соколь, толщиною тела съ Курицу; ноги и переносье желпыя; перья на спинъ изь черна сизыя; грудь былая, брюхо былое сь черными пятнами; жвость сь иминдер поясами; на щекахъ также по черному пящну. Водится въ горахъ и гивзда вьеть по X 2

vms.

утвсамь. Стю породу почитають наиспо-

3. Скола, величиною поменьше Орла; ноги и переносье имфеть синтя: голова быльсоватая; спина черноватая; грудь и брюхо
былыя; наиболье примышна, что у львой ноти пальцы нысколько соединены перепонкою.
Водится вы горахы подлы рыбы гды по больтой части ловить рыбы и утокы.

4. Кречеть, величиною почти со Скопу; переносье синее, а ноги у иныхъ желтыя, у другихъ также синтя; сверьху перье темноватое, а съ изподи бъловатое съ темными поясами; въ хвость по бокамъ бълыя перья, Водится въ полуденной Росси по горамъ, гдъ степные народы его для охоты всъмъ хищнымъ птицамъ предпочитаютъ.

Примвчаніе. Прочія Ястребинаго роду птицы, каковы быльс и желтые Луни, Мыс-шелопы, Косшу зы, Кобчики, Постульги, Бала-баны, Канюки, и проч. извістны віз тіхі містахі, гді оні водятся, сколько пользою, что изтребляють излиществующих мыстей, птичекі и других гадині, столько телько

читаеть

вредомЪ, что не находя ничего въ полѣ таскаютъ со дворовъ цыплятъ дворовыхъ птицъ.

5. Сопа; ихъ много есть различных породь въ разсуждении цвъта перьевъ, величины, ушатости или безь ушей и других в нъкоторых в приметь. Главнейшія их примъты имъть нось покляной безъ переносья, какъ у Орловъ; лице плоское; голова и глаза большія; ноги мохнапімя; когти два на переди, одинъ назади и одинъ съ боку, такъ что можеть вертеться и взаль и вперель. Вообще онв всв также хищныя птицы, но жищничество свое производять только ночью, ибо тогда только видять; летають неслышным в образом в, питаются мышами, нетопырями, маленькими птичками, ночными бабочками. Гивзда вьють въ укромонныхъ мвстахь, въ рассвлинахь, либо на вовсе неприступных утвсах Вадневавшія гдв нибудь до бъладни бывають позорищемь до самыхъ сумерекъ воробьямъ, кои не престають ихъ всячески безпокоить и сживать съ того мъста да съ другаго. Примъченных в сидящих в на кровль простый народь несправедливо почитаеть предвъстниками смерти. Изъ Совинаго роду достойнъйшія примъчанія:

- а. Филинъ, Бугалинъ, величиною съ большаго Орла, ушатой; перьемь бурой съ желтыми крапинами. Водится въ темныхъ лъсахъ, гдъ по зарямъ и ночамъ кричитъ голосомъ подобнымъ человъческому лугу и тъмъ въ простомъ народъ представляетъ мнимаго Лешая.
- о. Белой Филинь, Тумана, весь быль какы сныть, или иногда и съ рыдкими черноватыми пятнами; величиною поменьше Филина и безь ущей; водится по сывернымы тундрамы.
- п. Сычь, величиною съ Воробья, весь сфренькой, безъ ушей; а на крыльяхъ по пяши бълыхъ пяшнышекъ. Водишся повсюду въ Россійскихъ льсахъ.

### Опдъление II.

## О Соровыхъ лтицахъ.

#### \$ 55.

Соропыми липицами называются лёсныя птицы, кои имёють нось клиномь, различной длины, и верхняя челюсть сводомь; у ногь ногь по три пальца на переди и одинь назади, посредствомь коихь онъ ходять величаво, или припрыгивая.

### § 56.

Онт обитають повсюду вы льсахы; питаются разнымы соромы и червячками вы сору находящимися; гывзда пьють на деревьяхы; ящь носять оты пяти до седми, кои насиживаеты самка, а ее вы ето время кормить самецы; по вылуплении молодыхы самецы и самка кормяты ихы сыбыца принося вы роть червячковы, покудова не оперятся.

### \$ 57.

## Примъчательнъйшія изъ нихъ

- 1. Сорока, извъсшная всъмъ птица, имъющая голову и спину черныя; брюхо и по крыльямъ большія пятна бълыя; хвость длинной, изъ черна зеленоблестящій. Обитаеть въ лъсахъ, но для сору болье держится около жилыхъ мъстъ.
- 2. Ворона, побольше Сороки, собою сѣрая, а голова, хвость и крылья черныя; водится повсюду по лъсамъ и около жила.

X4

При-

Примвчание. Въ Сибири около Енисейска водятся такъ называемыя черныя Вороны, совсемъ похожия на Грачей, однако
какъ отъ сихъ, такъ и отъ нашихъ Воронъ
особы, и гдъ си черныя Вороны есть, тамъ
нашихъ не водится.

- 3. Галка, величиною съ Сороку, но хвость короче и вся черная, выключая перъя около шеи, которое кажется сизъе. Водится около ло пустыхъ жильевъ и лъсовъ.
- 4. Грачь, величиною съ Ворону, но весь черной, и примътень токмо тъмь, что на носу ко лбу имъеть лупящуюся всегда кожицу, который кажеть отв того бъльсовать и в Водится наипаче по пашнямъ, гдъ и немало урону причиняеть посъянному или подымающемуся хлъбу. Ночуеть стадами на избранномъ однажды древъ.
  - 5. Воронь, во всемы похожь на Грача, но больше, и не имъеть у себя на носу тоя бъльсоватости; кромъ того перье къ солнцу блестящее. Водится также по полямь, но ночевать ультаеть въ уединенныя мъста.
  - 6 Кокушка, величиною съ Сороку, но собою съренькая, подъ исподомъ съ тонкими черно-

церноватыми полосками; жвость длинноватый и также съ полосами; нось и ноги желтоватыя; пальцовъ два напереди и два назади. Водится въ лъсахъ; гнъздъ себъ не вьеть, а кладеть яица въ чужія маленькихъ птицъ гнъзда; примътна тъмь, что поеть до петровокъ куку.

7. Дятель; ихь много различных видовь: зеленые, пестрые, и самые больше вст черные, выключая темя алаго, желны; примътны прямым своим треугольным носом и на ногах двумя на переди и двумя назади когтиями. Водятся въ лъсах пробивая носом кору и изъ подъ оныя выпускным своим языком червячков доставая.

Примвисние. Прочія Россійскія птицы къ Соровымь принадлежащія, какъ: Сойка или Кукша; Кедропка; Возуля; Сипоронка; Иполга; Тикунь или Вертиголопка; Пололзень; Ледешникъ, Синій поробей или Изанокъ; Пура; Удоль; Пищуха; извъстны больше по особливости своихъ перьевь, нежели вредомь или нользою, изъ которыхъ шкурокъ выпарывая красивыя мъста сшивають муфты.

## Опавление III.

## О Водяныхъ лтицахъ.

# \$ 58.

Подь именемь Водяных разумьются такія птицы, кои станомы плотны, тяжелы, нось имьють покрытый перепонкою, а челюсти зубчатыя. Ноги обыкновенно не на срединь тьла, короткія, сжатыя, пальцы соединенные кожею; тьло покрыто плотнымь перьемь, а подь онымь находится густой пухь.

## \$ 59.

Онт вст вообще перелтиныя птицы, сонтають на водахь, гдт плавая, ныряя и длинною своею шеею доставая до дна кормятся травою, подводными кореньями, червячками и проч. гнтзда пьють около водь на ровныхь мъстахь или кочкахь; носять ница въ множествт, которыя высиживаеть самка одна, а вылупившихся водить на воду для снизканія пищи самимь собою. Прильтають и ультають обыкновенно большими или малыми стадами, когда и лучшій ихь промысель бываеть. Ловять ихь различно для мяса, перья и пуху, или вынимають яица. Нъкоторых хорошихь пырей можно обучать ловить рыбу.

The second of the particular of the second of the second

## § 6o.

# Важивишія по своей пользв

1. Гусь, птица дворовая, при воспитаній перьемь весьма различною здёлавшаяся; но дикіе безпрестанно бывають сёры, нось и ноги красныя. Польза, для чего онт воспитываются, всты извтетна; дикіе же водятся повсюду при водахь.

Примьчаніе І. Лучшія породы Гусей почитаются Китайскія; у нась славные гуси Арзамосскіе; быльсе гуси красивье и перье и пухь ихь дороже; а сырые сы былымы носчые. Гусь самець отличается оть самки, что шею имьеть длинные.

Примьчаніе 2. Гусей диких вы Россій есть многія различія поды особыми именами, какі: Бубоносикь, Чугайка, Гуменникь и проч. Но сіє произходить оть мысть, гдь они кормятся. Прямыя Гусей отличія суть: Былой гусь или по самовдски Варакь, водящійся

на Съверъ въ Сибири: Нормотт тамъ же; Чагной по всей Съверной Сибири; Каза ка по всей Сибири и въ нъкоторыхъ мъстахъ Россіи.

- 2. Авбяд, вдвое больше Гуся; собою весь бълой и только нось, глаза и ноги черныя. Водится въ приморскихъ мъстахъ; въ домахъ содержится для красоты и голосу; мясо и яица ихъ не очень вкусны.
- 3. У тка; родь весьма пространной и различной вы своихы видахы: величиною всы меньте Гуся. Польза оты всыхы одинакова, состоиты вы мясы, яидахы, перы и пухы. Оны весьма прожорливы, но вы хозяйствы прожорство свое изграждающы плодовитость, что носять много яиды, и инныя выводять утять дважды вы льто.
- Д. Гага, величиною немного поменьше Гуся; самець бълый съ черными крыльями и спиною, а самка сърая. Примъчательна по своему весьма дорогому пуху, который собирають у нея съ гнъздъ, втемыхъ по утъсамъ Съвернаго Октяна; онъ столько мягокъ и упругъ, что моченаго горсить высушенная изподоволь въ жару наполняетъ средственной тюфякъ.

Примвчаніе. Прочее множество Утокъ извъстных въ Россій подъ особливыми имен нами, но пользою одинаковыя суть: Пъганая утка или Атайка; Турпанъ; Сынга; Сипунъ; Илатка; Соксунъ или Широконо:7; Кракъ; Негразнять или Полуха; Красная утка или Варнана; Гоголь; Синцъ; Острохность; Савка, или Ауляхъ; Голубая утка; Чирокъ двухъсортовъ; Каменушка; Селезенъ или Крякопня; Чернетъ.

- 5. Крохаль, величиною съ Гуся, собою пестрой, нось цилиндрической, зубчатой, красной, на головъ хохоль гребнемь, ноги красныя. Водится по ръкамь и озерамь; ныряявь воду ловить рыбь, коими питается; отъ чего и мясо невкусно, такъ какъ и всъхъ прочихъ рыбою кормящихся водяныхъ, ниже слъдующихъ птиць.
- 6. Баба, гораздо больше Лебедя, собою нечисто бълая; нось длинной, горизонтально плоской; у нижней челюсти коженой подбородокь, висящей оть конца носа до горла. Водится по заливамь большихь ръкь и рыбынымь озерамь вы полуденной Россіи, гдъ сплотившись множествомы заганивають рыбу вы глухое мъсто и разпустя нижнюю челюсть на подобіе сатка цълкомы глотають.

- 7. Баклань, изъ того же рода Бабь, но величиною поменьше Гуся; нось цилиндрической, зубчатой; подбородокъ голый; собою сърочерный. Водится около морей, ныряя вы воду за рыбою; изъ нихъ научають ходить въ воду ловить рыбу, которую чтобъ не глотали, надъвають имъ на шею кольцо.
- 8. Гагара, отличается от прочих водяных птиць прямымь своимь и весьма острымь носомь, по томь ногами позадь туловища находящимися, по чему она только плавать и нырять, а не ходить можеть. Впрочемь перьемь разныя разно бывають. Водится по водамь сладкимь и морскимь, ныряя вы
  воду и такъ промышляя себъ рыбу. Глазь
  у сея птицы столь острь, и проворство
  столь велико, что на водъ ръдко, чтобь она
  не увернулась от пули; пораненая же уходить вы воду и тамь скватясь носомь за
  что нибудь умираеть.
- 9. Мартышка, величиною съ Курицу, но крылья длиннве и жвость горизонтальной; нось сжатой, ноги красныя съ соединенными пальцами; перьемъ бълая, а спина сърая; крылья чернве. Водится по всъмъ ръкамъ, озерамъ

озерамъ и морямъ, лѣтая надъ водами, дабы схватить всплывшую невзначай рыбу. Ихъ есть многія различія; но пользы нѣтъ ни отъ которой, кромѣ ихъ яицъ, кои нѣкоторые народы употребляютъ въ пищу.

Примвчанів. Прочія Водяныя птицы въ Россіи, въ пищу не употребляемыя, но имменемъ токмо извъстныя суть: Лутокъ или Рыбачка; Паганка; Тупикъ; Старикъ; Мыча-гатка; Погодопъстникъ; Кагоперъ или Кагоръ; Чайка или Рыболопъ.

## Опавленте IV.

## О Голгнастых в лтицах в.

# § 61.

Голенастыми называются такія птицы, кои тівломі невелики, безхвосты; нось имівтоть прямой, клиноватой; шея длинная, ноги длинныя же, за колено голыя; а пальцы у инных врознь, у других соединены до половины перепонкою.

\$ 62.

Обитають онв обыкновенно по болоти-

RAOX

ходя въ водъ по колено длинного своею шеею достають со дна раковинки, червячки и другія водяныя насекомыя; гньэда пьють на возвышенныхъ мъстахъ, или на деревахъ; носять отъ трехъ до четырехъ и пяти яицъ. Мясо ихъ наипаче молодыхъ вкусно.

## \$ 63.

#### Извъстивищия въ России:

- 1. Журапль, вышиною аршина на два или немногимь менте; собою весь строй; но на щекахь по бълому пятну; затылокь и крылья черныя. Водится по полямь и степямь, тат гнтза вьеть на ровномь мъстт моломые, не могуще лътать, спасаются бъгомь, а догнанные защищаются голенями. Употребляется въ пищу.
- 2. Анстъ, Бусель, Бачанъ, совсемъ похожь на Журавля, но собою нечистой бълой; нось и ноги красноватыя. Водится по мокрымы лугамъ питаясь лягушками, ящерицами и прочими гадами; гнъзда вьетъ на крышкахъ и трубахъ жилыхъ домовъ.
  - 3. Цапля или черной Ансть, поменьше Журавля, а тыломы потолще; щея и ноги коро-


че журавлиной, нось красной, ноги темнъе; собою сърочерной, брюхо бълое. Водится по мокрымь лугамь и лъсамь. Питается какъ и бълой Аисть.

- 4. Чепура; онъ бывають различныя, сърыя, бълыя, красныя; величиною меньше Журавля, а цвътомъ вся одинакова; когда сидить или лътить, то шею всегда скорчиваеть изогнувь впередь. Водится обыкновенно по берегамъ ръкъ и озеръ.
- 5. Красной Гусь, вышиною больше Журавля, но тёломы немного толще Курицы; собою весь алой кромё крыльевы, которыя черныя. Водится около Каспійскаго моря по рёкё Ембё; гнёзда вьеты на высунувшихся изы моря каменьяхы.
- б. Коллица, вышиною около аршина, а туловище съ куриное; собою вся бълая какъ снъгъ, выключая носа и ногъ, кои черныя, и изъ коихъ первый горизонтально плоскій, къ концу разширяющійся на подобіе лопатки. Водится вь полуденной Россіи около морей и впадающихъ бъ нихъ рѣкъ.
- 7. Дудакъ, Драхна, величиною съ Индъйскаго пътужа, но перьемъ желтосърая съ чер-

ными волнистыми струйками по всему тваму, подъ брюхомъ бълье, подъ горломъ на подобте усовъ волоски. Водится въ полуденной Россти по степямъ и полямъ, питаясь съменами и травою. Употребляется въ пищу.

8. Стерлеть величиною съ Утку, но собою пестрой и когда лътить, то перья у него свистять. Употребляется въ пищу-

Примвчаніе. Прочія вы Россіи извъсшныя птицы сего от двленія суть: Стерхв; Быкв или Выпь; Кпакпа; Нужда; Карапайка; разные сорты Куликопь; разные Турухтаны; Чибись; Морская сорока или Крипохь; Крастель или Дергачь; Лысуха или Чортопа курица и проч. Всъ почти, выключая Куликовь, Турухтановь, Чибисовь и Крастелей, безь употребленія.



# Отавление V.

## О Куряныхъ лтицахъ.

\$ 64.

КЪ Курянымъ принадлежатъ такія птиды, кои имѣють носовую верхнюю челюсть сводомь, объемлющую нижнюю, ноздри полузакрыты хрящевою перепонкою, пальцы у ногь будто сь зазубринами и поды изподомь шероховаты; кромѣ того на ногахъ у самцовъ имѣются бодцы.

# § 65.

Обитоють по большой часши въ шеплыхъ странахь; но стараніемь человъческимь разведены и въ холодныхъ. Питаются зернами растьній, кои какъ для себя, такъ и для дътей размачивають у себя въ зобу Гивэда пьють на земль; янць носять по многу. Высиженныхъ водять за собою, и гдъ найдуть что клевать, туда всъхъ къ себъ скликають. Выводятся въ домахъ для мяса, яицъ и нъкоторыя для перьевъ.

## Славнъйшія изъ Курянаго от дъленія въ Россіи:

1. Петухъ, Курица, извъстивишая въ домашнемъ быту птица, которая отъ воспитанія получила чрезвычайное множество и
цвътовъ перья и различій породъ. Примътна
наипаче вертикальнымъ своимъ хвостомъ, который однъмъ только Пътухамъ собствененъ, и по томъ гребнемъ и подбородками;
кромъ того собственно Пътуху пъть по ночамъ. Родомъ изъ восточной Индіи; у насъ
разведенной- составляетъ обыкновеннъйшую
дворовую птицу, отъ которой получаемъ
наиначе цыплятъ, янца и нъкоторымъ образомъ перья.

Примвианіє. Къ роду Пѣтуховъ принадлежать всѣ различные виды прекрасныхъ Фазанопъ, которые у насъ водятся только на Терекѣ и за Байкаломъ.

2. Индейской петухъ, Индейка, птица большая, перьемь черная, а жвость и крылья рыжеватыя съ черными волнистыми струями, изъ коихъ, когда начнетъ гордится, то первый

вый подымаеть колесомь, какь Павлинь, а крылья опущаеть и волочить по землю; кромь того примътень красными своими шищ-ками на носу, по головь и около-шеи. Родомь изь Америки; у нась воспитывается вь домахь для мяса.

- 3. Паплинъ, прекрасная перьемъ птица; величиною съ больщаго Пътуха, но хвостъ имъетъ весьма длинной, изписанный золотыми и лазоревыми глазками, который вышедъ на солнце, или увидя себя въ водъ, подымаетъ колесообразно. Родомъ изъ восточной Индіи; въ садахъ большихъ господъ содержится для красоты. Питается бабочками, мушками и другими лътучими насекомыми, также зернами. Самка съринькая, противъ самца нимало некрасива.
- 4. Глухорь, величиною съ Гуся; перьемъ темножелтый въ прочернь; брови голыя, красныя, ноги можнатыя, на крыльяхъ по бълому пятну. Водится по всъмъ лъсамъ въ Росси питаясь древесными шишками, сережками, почками, можжевеловыми ягодами и другими съменами. Гнъзда въетъ на землъ прикрывая мхомъ, такъ что узнать почти не

можно; молодых в кормить комарами. Употребляется вы пищу.

5. Тетерень, похожь на Глухаря, но вдвое меньше; собою весь черной съ бълыми пяшнами на крыльяхь и алыми бровями; но хвосшь на объ стороны косами. Водится въ тъхъ же мъстахь и питается какъ и Глухарь. Зимою часто зарывается въ снъгъ.

Примвисніе. Прочія птицы, принадлежащія ко сему Куряному отділенію суть: разныя Куропатки, Рябчико и Перепілка, которыя вст употребляются во пищу.

#### Отабление VI.

О Воробейныхъ лтицахъ.

\$ 67.

КЬ Воробейнымь лтицамь принадлежать мых птицы, славящіяся своимь голосомь, которыя имыють нось коническій, заостреный, ноги тоненькія, скакальныя.

#### € 68.

Офтають онв вы лвсахы и по кустарникамы, литаясь инныя насекомыми, другія свменами; гивзда пьють весьма искусно общими силами силами самець и самка, также и сидять на яицахь поперемьню; вылупившихся кормять изь носу. Употребляются инныя вы пищу, другія для пріятнаго пынія.

## § 69.

# Славныйшія сего отдыленія Россій-

1. Голубь, птица въ семъ отдълени самая больтая различествующая цвътомъ перьевь, такъ какъ и всъ домашния птицы; дикия обыкновенно дымчатато цвъта. Носъ у Голубя прямой, коего ноздри прикрыты мясистою перепонкою; собственно Голубямъ имъть красныя ноги. Водится дикий въ лъсахъ; домащий подъ кровлями и въ уголкахъ, тдъ свивъ себъ гнъздо носить въ теплыхъ странахъ каждый мъсяцъ по два аица, по толубю и по голубкъ, коихъ вылупившихся кормить изрыгая размоченныя зерна изъ своего зобу къ нимъ въ носъ. Употребляются для у довольствия гонять голубей и для пищи.

Примвианів. Между Голубями есть многія различія, коих охотники по гоньбв раздвляють во перьвых на козырных и чи-

IJ 4

стых в з

стыхь; вы обоихы же сихы раздыленіяхы бываюты мохноногіг, поркуны, хохлатые, трубастые, пихри и проч. Но вы каждой землы есть еще свои виды и отличія. Дикой везды одинаковы и называется Ветютень. Кы Голубямы же принадлежиты и Горгица.

- 2. Жапоронокъ, птичка маленькая, перьемъ съринькая, примътна наипаче заднимъ своимъ ногтемъ, который, собственно жаворонкамъ, бываетъ очень длиненъ. Водится по открытымъ полямъ, кроясъ межъ земляныхъ глыбокъ, съ которыхъ весною подымаясь перпендикулярно поетъ безпрерывно: тирили тирили, покудова опять на землю не опустится. Питается зернами и червячками.
- 3. Скиорецъ, почти въ половину меньше Голубя; перьемъ черный, блестящій съ бъльми крапинами. Водится по паствамъ; питается червячками; гнъзда вьетъ въ дуплахъ. При-ученые выпъваютъ всякія пъсни.
- 4. Дроздъ, величиною съ Скворца, перьемъ съроватый въ прожелть и съ черными крапинами; носъ и ноги желтоватыя. Водится въ лъсажъ; питается наипаче омелою и съменами другихъ деревъ, которыя и разсъваетъ по другимъ

другимъ мъстамъ. Гнъзда вьетъ межъ сучковь. Въ ясные дни всбившись на верьхъ лъсины поеть защуря глаза довольно громко.

- 5. Сингирь, величиною побольше Воробья; вся алая и только темя и крылья черныя; нось толстой и короткой. Водится въ красных въ лъсахъ. Держится въ домахъ для тижаго, но пріятнаго пвнія.
- 6. Щегленокъ, величиною съ Воробья, изпещренной разными цвътами, желпымъ, бълымъ, чернымъ, краснымъ. Водится перелъскамъ. Содержится въ клеткахъ для nbhia. 34 graf gastratagi tribi di kata kalamilika iki bakka
- 7. Чижъ, меньше Воробья, весь зеленой съ черными крыльями. Водится въ красныхъ лъсахЪ. Содержится въ клеткахъ для пънія.
- 8. Солоней, величиною съ Воробья и такой же сфринькой, но станом уклюжье и на ногахъ выше. Водится по рощамъ, гдъ забившись въ чащу поеть защуря глаза наипаче по зарямъ весьма громко.
- 9. Ремезъ, маленькая птичка, собою сврожел тенькая съ черною по глазамъ чертою и черными крыльями и хвостомь. Водится по камышамь и около рекь, где гнезда вьеть

изъ тополоваго пуху, висячія на сучкахъ, на подобіе лагунки, а плотностію какъ валеной чулокъ, со входомъ съ боку.

10. Ласточка, извъстная около жильевъ маленькая птичка, собою черненькая, подъ горломъ съ красноватымъ пятномъ и бълымъ брюшкомъ. Водится около домовъ, строя гнъзда подъ кровлею изъ наносимаго ртомъ илу. Питается жватая на воздухъ насе-комыхъ.

Примвчаніе. Прочія къ сему отдъленію принадлежащія птички суть: Спиристель, Клід:ть, Подорожникь, Воробей, Чечотка, Синица, Коноплинка, Опсянка, Трясогузка, Варакушка, Кня ідкь, Стрижь, Лилекь или Чурияко; которыя всё мало вь употребленіи, развё нёкоторыя въ пищу.

## Прибавленте.

# О знативищихъ Иностранныхъ птицахъ.

1. Грифъ, хищная и въ своемъ родъ величайшая птица, имъющая носъ прямой, на концъ загнутой; когти большіе, но ногти пряпрямые; голова и половина шеи голыя; перье на спинъ черное, съ изподи бледнъе; когда лътить низко по землъ, то производить даже вътерь и шумъ чрезвычайной; пространство между разпахнутыми крыльями двъ сажени и болъе. Находится въ Америкъ въ Королевствъ Перу, гдъ питается телятами, баранами, а видали, что и десятилътнихъ ребять подхватываеть на воздухъ и уноситъ. Два Грифа одолъвають корову и съъдають. Гнъзда вьеть на высочайтихъ и неприступныхъ скалахъ.

Примвчание. Подобные сему хищные Коршуны, но меньше, находятся въ разныхъ частяхъ свъта, кои всъ имъють головы голыя; и какъ онъ въ недостаткъ живья не гнушаются питаться и всякимъ падалищемъ, то от всъхъ ихъ обыкновенно воняеть весьма противно. Кромъ того обще сему роду птицъ имъть у себя на груди пузырь, въ который скопляется вонючи гной, и когда пузырь сей накопившись полонъ начинаетъ птицу тяготить и безпокоить, то она проклевываетъ его и выпущаетъ гной, что подало причину къ баснъ о Фениксъ.

- 2. Попугай, родо весьма пространной, разнствующій и величиною и красотою перьевь своихь, кои бывають всякихь цвьтовь; нось у него покляпой какь у Ястреба, а у ногь два пальца на переди и два на зади. Находится вь жаркихь странахь по льсамь, льтая стадами и питаясь плодами разныхь деревь. Вь Европъ содержать ихь за красоту и что перенимають кое - что выговаривать.
- 3. Райская птичка, величиною съ Скворца, но перьемъ разныхъ наипрекраснъйшихъ цвътовъ; примътны наипаче имъющимися у нихъ въ хвостъ двумя длинными на подобте щетинъ перьями. Водятся по Молюкскимъ островамъ стадами, питаясь разными насекомыми.
- 4. Мушка или Колибри, малвишая изв всёхъ пернатыхъ птичка, но красивостію перьевь уподобляющаяся цвётамъ дорогихъ каменьевь и тёмъ всёхъ превосходящая, бываетъ златозеленая, краснозолотая, топазовая и проч. Водится въ Америкъ, гдъ лётаетъ на подобіе большой пчелы весьма скоро по цвётамъ и питается содержащеюся на днё ихъ сладостію. Стрёляють водою изъ насосовь.

5. Фаетонъ, величиною съ Утку; перьемъ бъль какъ снъгъ, на спинъ только съ черными струйками; чрезъ глаза проходить черная полоска; нось сжатой, клиномь, преострый, зубчатый; ноги красноватыя, у коихЪ вст четыре пальца вмъстт соединены перепонкою; крылья острыя, снизу бълыя, сверьху у плавильных перьев внешняя по длине половина черная; въ жвостъ два пера предлин-Водится собственно токмо подъ Екваторомь, гдв льтаеть превысоко, такь что его почти не видно; онъ увидъвъ оттоле встревоженных въ моръ другими хищными морскими живопными рыбъ и скачущихъ изъ воды пущается на нихъ со всей высоты какъ молнія, подхватываеть и темь питается.

6. Строфокамиль, величайшая изы всёхы птицы, вышиною будеты вы человёка, но туловищемы не толще лебядинаго, шел и ноги длинныя; головка маленькая, плешивая; носы подобены кеглы; ноги голыя, толщиною вы коровый о двухы толстыхы пальщахы; перье строе, вы хвостьжы былое, кудрявое, качествомы своимы извёстное поды именемы плю-

мажа; въ крыльяхъ перьевь не имъеть, по чему и не лътаеть, а только чрезвычайно скоро бътаеть. Водится въ жаркихъ странахъ Африки и Аравій; гнъздъ не вьеть, а кладеть многія лица въ ямку въ пескъ вырытую и на солнцъ, самкажъ сидить на нихъ только ночью. Промышляють ее гоняя на лошадяхъ, начиная безпрестанно съ того мъста, гдъ спугнули, покудова устанеть, по тому что онъ бътаеть все кругомъ, такъ что поперечникъ онаго круга бываеть версть по пяти, тести и болъе.

- 7. Струсь или Жаръ лтица, поменьше Строфокамила; перьемь весь черной; на головъ гребень остроконцею шишкою; на ногахъ три пальца. Лътать также не можеть, а только бъгаеть. Находится въ Африкъ и по Молюкскимъ островамъ.
- 8. Африканская курица или Африканка, величиною побольше нашей курицы; голова безперая съ шишкою, подъ щеками висятъ красные подбородки; перье все либо черное съ бълыми полушечками по всему тълу, либо сърое. Природою изъ Нумидіи; у насъ разводится для любопытства и красоты въ садажь большихъ господъ.

9. Кинарейка величиною съ Чижа, но собою вся желіпенькая. Находится на Канарскихъ островахъ. Содержится въ домахъ для пънїя.

#### Классъ Ш.

## О Земноводныхъ.

## § 70.

Вемноподныя суть такія животныя, кой вмѣсто всякаго покрывала имѣють кожу голую, различно только образованную; во рту инныя имѣють зубы, другія только твердыя челюсти; для движенія своего инныя имѣють ноги, другія перья, инныя ничего, а движутся извиваніемь своего тѣла; по чему и тѣло ихъ мускуловато и вмѣсто твердыхъ костей имѣють гибкіе хрящи. (По внутреннему строенію смотри ∫ 15.)

## § 71.

Живошныя сій наиболье холодныя и чрезвычайно живучія обыкновенно имьюшь видь прошивный и непріяшный; запахь дурной; голось хриповашой; къ шому же многія изъ нихъ нихъ будучи ядовины заставляють безъ изъятія всъхъ себя убъгать и остерегаться.

#### \$ 72.

Обитають наиболье подь жаркими поясами вы мыстахы сырыхы, глухихы, уединенныхы; ныкоторыя вы открытыхы водахы, другія и вы водахы и на сухомы пути. На зиму зарываются или вы норы, или вы илы поды водою; ныкоторыя морскія наблюдають переходы изы страны вы страну.

## \$ 73

Питаются жищничеством других животных вотных вотных нападая или силою, или коварством в не удастся же ни темь ни другим, голодь сносять безбедно долее всех живот ных в на светь.

#### \$ 74.

Произподять себъ подобныхъ или рождая живыми, или нося перепонковыя яйца, которыя не насиживають сами, но оставляють въ пескъ, въ навозъ и проч. теплотъ солнца, воздуха или воды; при томъ вылупающіяся молодыя или выходять совершенными животными, или пакими, кои еще нъсколько своихъ видовъ перемънять.

#### \$ 75.

польза от них малая: но чтоб совершенно челов ку не были безполезны, то нашли въ нъкоторых особливый вкусь для употреблен въ пищу; въ лъкарстважь; другія для других полезных издълій.

# \$ 76.

По внышнему ихъ виду и мысту житія раздылимь ихъ на три отдыленія: на Быгающіе, на Ползающіе и на Плапающіе гады.

#### Отдъление І.

in the above the

#### • О Бъгающих В земноводных В.

#### 6 77.

Подъ именемъ Бъгающихъ Земноподныхъ разумъющся всъ шъ, кои имъющь у себя ноги, къ хожденію ли, или бъганію, или къ плаванію способныя; по чему инные ходящь и плавающь, другіе бъгающь и плавающь; инные плавающь и прыгающь; другіе бъгающь и лъщающь.

Обитають инные на сухомы токмо пути, другіе на сухомы пути и вы водь; литаются насекомыми и червями, которымы какіл гдв случатся.

# § 79.

Къ сему отдъленію земноводныхъ принадлежать слъдующіе роды:

1. Черепаха, желиь, ихъ въ полуденной Россіи два или три сорта примъчается, одна морская, другая ръчная, третья сухолутная. Всъхъ ихъ родь примътень тьмь, что онъ сверьху и снизу покрыты костянымъ щитомь, прикрытымь снаружи роговою перепонкою, промежь котораго выходять голова, ноги и хвость. Морскія отличаются оть ръчныхъ и сухопутныхъ, что онъ имъють вмъсто ногъ ласты. Величайти изъ черепахъ бывають морскія, имъющія въ длину аршина по два и по три, которыя водятся въ Южномь Окіанъ; таковыя въ тъхъ мъстахъ употребляются въ пищу, а верхняя роговая плена на разныя издълія.

- 2. Лягушка, живошное четвероногое, безжвостое, имфющее кожу голую, слизкую. Обитаеть наиболье вы водажь, однако бываеть и на сухомы пути, наипаче если мьсто сыровато. Изы нижы есть также морския, болотныя и земляныя, которыя сверыхы своего вида ничьты другить не разнятся, какы мьстомы пребывания. Изы морскихы славныйшая есть Пила, которая дьтей своихы на спинь выводить. Изы земляныхы Буфонк, которая вы нькоторыхы мьстахы, сказывають, ядовита бываеть; изы болотныхы зеленонатая, которую употребляють вы пищу.
- 3. Драконь, во всемь похожь на ящерицу, выключая что подь плечами имъеть крылья къ переднимь ногамь присоединенныя; находится въ Индіи и Африкъ по лъсамь.
- Д. Ящерица, животное четвероногое съ жвостомь, безъ крыльевь, покрытое кожею въ различныя чешуи образованною и разными цвътами изписанною. Находится во всъхъ частяхъ свъта, питаясь насекомыми. Изъ Ящерицъ славнъйштя:
  - а. Крокодиль, длиною часто вы три сажени и болье бываеть; имъеть пасть препро-Ч 2 стран-

GIRLD BASE

странную, унизанную по краямь острыми зубами; хвость плоской, зубчатой. Находится вь Африкъ около большихь ръкь, гдъ и по сухому пути бъгаеть и вь водъ плаваеть. Питается разными большими сухопутными и водяными животными, нападаеть даже и на человъка. Яиць носить множество перепонковыхь, которыя кладеть вь пескъ Вылупающихся самка манить вь воду, непроворныхь пожираеть. Лютое сте для человъка и другихъ тварей животное уменшаеть въ количествъ фараонова мышь, которая его только и другихъ гадовъ яицами и питается.

о Хамелеонь, туловище имветь длиною поменьше четверти, толова у инныхь четвероугольная, у другихь гребнемь; кожа на твлв и хвоств гладкая, мвлкочещуйчатая. Находится вы Азіи и Африкв. Примвчанія достоинь твмь, что при каждомь цввтв кожа его принимаеть на себя такой же цввтв, какой передь собою видить.



## Отавление II.

## О Ползающих вемноводных в.

## 

Къ Ползающимъ земноноднымъ причисляются такіе, кои длинны, круглы, къ движенію своему ни ногь, ни перьевъ не имѣють, а переходять съ мѣста на мѣсто извиваясь съ помощію чешуй и поясовъ, на брюхѣ ихъ и хвостѣ находящихся. Онѣ собственно называются Змѣями.

## § 81.

Онт имтють пасть весьма пространную, усаженную зубами и у нткоторыхь смертоноснымь ядомь наполненными клыками, посредствомь коея проглатывають вдвое толще себя добычу, которая состоить вы
птичкахь, маленькихь звтркахь, лягушкахь,
ящерицахь и проч. Перепонковыя свои яица,
соединенныя между собою на подобіе четокь,
кладуть вы навозь или другое теплое мтсто,
гдт молодыя вылупаются сами.

Обитають наиболье вы жаркихы странахы, но есть нысколько и вы умыренныхы; зиму проводять вы норахы или разсылинахы, а вестою вышеды изы своего зимовья скидають прошлогодную сь себя шкуру.

## \$ 83.

## Славныйшія изь змыйнаго рода:

I. Змій лютый, длиною вы сажень и болье, цвътомь сърой, на концъ жвоста имъеть тремушку, на подобіе двойных пузырьковь, ежегодно наростающихъ, которыми гремитъ, когда осердится, и тъмъ даеть о себъ знать, если гдъ сокрытъ находишся. Онъ весьма ядовинь и угрызеніемь своимь производинь разпаление вы легкомы, пакь что вы краткое время человъкъ задушается. Свинья его всть безвредно. Дикихь птичекь, Бълокь и тому подобных взърков хватает будто обвораживая: ибо приползши къ дереву смотрить только пристально на птичку или звърка ротъ разиня, и она сама къ нему въ пасть спрыгиваеть. Находится въ Америкћ. 2. JAGHb,

2. Удань, вы семы родь Змый есть такія, кои оты одной до трехы сажены длиною бывають и вы человыка толщиною. Оны всы неядовиты, но вы тыль своемы одарены чрезывычайно крынкими мускулами, посредствомы коихы нападають оны на дикихы козы, баграновы и другихы звырей, около которыхы обвившись кругомы передавливають, сжимають и такы его и сы костями изминають, что походить на битое мясо; по томы обливы своею слиною и здылавы на подобіе шара проглатывають. Находится вы Америкь.

3. Наїн, свран, длиною аршина вы полтора Змін, примітна наипаче разширенною своею на хребтів кожею, на которой изображены будто очки, и которан, когда змін осермится, надувается. Она изы всіжь гадовы наиндовитійшан; фараонова мышь ен губитель. Находится вы Восточной Индіи.

Примвчание. Прочія Змы, изь коихь во всемь свыть десятая только часть ядопиты, а у нась вы Россіи вы полуденныхь только мыстахь одна или двы породы ядовитыми почитаются, всы безпредны и извы-

стны подъ общимъ именемъ Змен или Ужа и заслуживають мало вниманія,

Примьчание. Ядопитыя змы узнающся изь имъющихся у нихь вь верхней челюстивыпускныхв, собою пустыхв клыковв, коими онъ угрызая впускають вь укушенное мъсто ядь съкровію по всему тълу разносимый. Оный ядь, вы себя ртомы принятой, не вредень, лишь бы во ршу не было каких ранокъ, по чему наилучшее средство угрызеннымь эмьею пособлять высасываниемь сего яда; или разръзавъ ранку побольше выжащиемъ онаго съ кровію; ими прикладывая въ скоросни къ укушенному мъсту теплаго деревяннаго масла; или принятіемь внутрь и приложа снаружи летучей щелочной соли, для произведенія въ себъ сильнаго поту. Сіе последнее моглибь у нась производить парныя бани, если бы кЪ щастію Россія не была оть сихь смертоносныхь гадовь свободна.



#### Опідбленте III.

## О Плавающих В земноводных в.

## \$ 84.

Планающими земноподными называются такія животныя, кои внёшнимі видомі и мёстомі житія совсемі похожи на рыбі, также и для движенія своего иміюті перья какі рыбы, но внутреннимі строеніемі, а наипаче что иміюті и легкое и жабры, (кои посліднія однако оті рыбьихі отличны) вмісто костей хрящи, и кожу гладкую, слизкую, разві костками, а никогда четиуею избукрашенную, оті оныхі отличаются.

## \$ 85.

Онъ обитають всъ въ морскихъ водахъ, откуда заходять временемъ и въ ръки. Пи-таются подводными кореньями, иломъ, мертвечиною и живыми водяными животными. Произподять или рождая живыми, или кладя яицами, которыя хотя походять на икру, но чернымъ своимъ цвътомъ отъ рыбей отъмънны.

# § 86.

Польза от них главний шая, что он под именемь рыбь употребляются вы пису; некоторых на вкусы неприятных кожа составляеть такы называемый шагрень; о прочих упомянуто будеть вы своемы месте.

## \$ 87.

# Примьчанія достойньйшія изв Плавающихь гадовь:

1. Вынь и Миногл, оба одинь отв другато малымь чемь отмичаются и похожи на
змей; имеють голову остренькую, маленькую, роть круглой, на голове отдушинку
для воды; по сторонамь шей семь отверстій для дыханія; перьевь неть, а плаваєть
и перебирается по сухому пути изб одной
воды вь другую извиваясь своимь теломь;
кожа черноватая, подъ брюхомь бёлее, вязкая; жвость копейцомь. Они весьма живущи, такь что изрезанные на куски и вь воду положенные, покудова не будеть горяча,
все шевелятся. Находится вь морскихь заливахь. Употребляются вь пищу.

2. Ckamb,

- 2. Скать, животное плоское, почти круглое, выключая назади хвоста; имфенть глаза
  на верьху, а роть подь изподомь; отверстій пять подь изподомь же пониже рта;
  кожа вся гладкая, на спинь съ пятью черноватыми пятнами. Не имфя никакого къ защищенію своему орудія защищается произведеніемь цепеньнія вь дотрогивающихся къ
  ней. Находится въ средиземномь морь. Многія другія изъ Скатоваго роду употребляются въ пищу.
- 3. Альть, ихъ много различій; всв они, большіе и малые, имвють видь Осетра, но кожа гладкая; роть подь носомь; во рту множество зубовь треугольныхь и зубчатыхь; по бокамь головы пять отверстій. Весь родь, большіе и малые, есть наиалчивйтый, наихищивитій изь морскихь животныхь, которые никогда почти спокойны не бывають, но то преследують рыбь и другихь животныхь, то гонятся за кораблями сь темь только, чтобь быть вы движеній и вы надежде нолучить или какой нибудь сь корабля сброщенной сорь, или подхватить опущенное, или разтерзать брощенное мерт-

вое тьло; по чему преслъдователи сіи неръдко схватывають и купающихся вь морь на веревкахь. Изь нихь славнъйшій величиною и алчностію своею Мокой или Песь морской, вь которомь неръдко нахаживали проглоченныхь въ латахь людей. По томь Пила рыба, также очень великая, но примътная длиннымь своимь на подобіе доски носомь, у котораго по сторонамь зубья. Всь онь находятся вь Европейскихь и другихь моряхь.

4. Осетръ, животное длиною аршина въ два, болъе и менъе, имъетъ острый свой нось и голову покрытыя костями, подъ комии прочее, черенъ составляющее вещество, хрящеватое; роть подъ носомъ, а передъ ртомъ четыре усика; кожа на тълъ гладкая изъусаженная рядами по спинъ, по бокамъ и по сторонамъ брюжа жучками или шиповатыми косточками и сверхъ того въ промежуткахъ костяными звъздочками. Находится въ Каспійскомъ и Черномъ моряхъ и во всъхъ больтихъ ръкахъ Россійскаго Государства, гдъ съ ноходящими на него Бълугою, Стерлядью и другими отъ смъще-

нія ихъ различіями составляєть важнъйшій Россійскій рыбный промысель, состоящій вы ихъ мясь, икрь, клеь, везигь и нькоторымь образомь кожь, изъ коей дълають мышки на мышковую паисную икру, окончины и варять изъ нея подобный шубному клей. Всь сій рыбы Осетроваго рода суть морскія и въ ръки заходять токмо для киданія икры, и тогда идуть онь большими стадами, по чему и извъстны у рыбаковь подь именемь рунной, а вь общежитій красной рыбы.

## Классь I V.

О Рыбахъ.

#### \$8.9 \$1860 Md RESPART

Живошныя водяныя, покрышыя снаружи чешуею и имъющія вмъсто ного и крыльево перья, называются Рыбами. По внутреннему строенію смот. § 15.

### \$ 89.

Положение ихъ тъла горизонтальное и становая кость, отъ головы до хвоста простирающаяся, изгибается токмо съ боковъ;

мясо, кости покрывающее, бѣлое, состоящее изъ множества мѣлкихъ мускуловъ, покрытыхъ снаружи кожею, укладенною плотно и гладко крупною или мѣлкою чешуею, облитою сверьхъ того жирною слизью.

### \$ 90.

Для движенія имфють онф перья на спинф, по бокамь, подь брюхомь и вы хвостф, числомь, положеніемь, фигурою и величиною различныя, состоящія изь разнаго числа разпорокь, соединенныхь между собою перепонкою.

#### \$ 91.

Обитають инныя вы моряхы, другія вы ръкахы, инныя вы озерахы; гдт и плавають инныя одиначкою, другія спіадами; при томы инныя днемы, другія ночью.

### € 92.

Питаются вы водахы, подобно животнымы на сухомы пути, инныя хищничествомы другихы живыхы разныхы животныхы, другія падалищемы; инныя морскими, другія сухонутными на дні сладкихы воды растущими быліями, другія тівмы и другимы. Произподать себъ подобных самки кидая икру, опложенную молоками самцовь, цвътомь красную или подь оный подходящую, числомь зернышекь, каждое особую рыбку производящих необьятнымь; которую чтобь вывести въ удобнъйшемъ мъсть, разныя избирають тихія и укромонныя отмъли; морскія подымаются даже изь подь полюсовь въ ръки, гдъ вода слажъ и теплъе; въкоторыя токмо, навсегда въ Окіанъ остающіяся, предоставляють икряное свое племя, на поверхности водь плавающее, призрънію холоднаго солнца.

Примечание. Рыбь морскихь, речныхь и переходныхь изы морей выреки можно разводить или приучать разводиться у себя вы водажь самихь: разводять морскихь вы соседственныхы морямы озерахы, каналомы соединенныхы; речныхы вы прудахы, нарочно вы неудобныхы ни кы чему местахы вырытыхы, или и вы самыхы речкахы, вы известномы поместые вы большия реки впадающихы; и при томы проякимы образомы: либо сажая молодыхы вы пруды,

пруды, не имѣющёе сообщентя съ открытыми рѣками; либо пущая опложенную икру, наловленную въ рѣкахъ; либо изловленныхъ большихъ самцовъ и самокъ, во время метантя икры, принуждая опложаться въ текучихъ своего помѣстья водахъ, съ тѣмъ чтобъ послѣ выросштя опять ежегодно возвращались сами для метантя икры въ родимую свою рѣчку. Въ Прусскомъ Королевствъ многтя болота обращены въ рыбные пруды; въ Китайскомъ же Государствъ не только моря и рѣки въ нихъ впадающтя рыбами изобильны, но озера, пруды, каналы и даже самые рвы оною наполнены.

#### \$ 94.

Польза от Рыбъ главнвишая, что онв употребляются вы пищу, и вы семы случав рваныя вы быстрыхы водахы почитаются здоровее жирныхы морскихы и невольныхы озерныхы; по томы состоить от некоторыхы вы икрв, вы жиръ, кожъ, чещув, клев и костяхы.

#### \$ 95.

По мѣсту ихъ житія можнобь Рыбь раздѣлить на морскихъ, рѣчныхъ, и озерныхъ; но какъ многія изъ нихъ могуть жить, и живуть вуть вы самомы дёль, вы тёхы и другихы водахы, то раздёлимы мы ихы по перьямы, яко кы движенію служащимы членамы, взирая особливо на тё, кои находятся поды брюжомы; и такы на Безперыя, Подгорлыя, Подгорлыя и Подбрюшныя.

# Опабление І.

# О Безперыхъ рыбахъ.

#### \$ 96.

Безперыми называются такія рыбы, кои подбрющных в перьев в совсем не им вють.

#### \$ 97.

Онт обитають вы моряхы, морскихы заливахы и вы устьяхы впадающихы вы нихы большихы рткы; плавають извиваясь на подобіе змти и по дну и по поверхности воды; литаются всякимы падалищемы, червяками, лягушками и проч. Рождають икрою, но молодыя вылупаются изы оныя прежде нежели самка выкинеть. Вообще онт чрезмтрно живущи, такы что содравы кожу, изртзанныя на куски долго шевелятся; равнымы образомы долго безы воды быть могуты.

#### \$ 98.

# Къ безперымъ рыбамъ принадлежатъ.

1. Угорь, тъломъ круглой какъ змъя, покрышый вязкою и слизкою кожею, на спинв сърозеленоватою, подъ брюхомъ бълъе; длиною обыкновенные въ аршинь, болве и менве, перьевь только два позадь жаберь; хвостовое соединено со спиннымъ и подхвоспінымъ. Находится по всъмъ Европейскимъ морямъ и ръкамъ въ нихъ впадающимъ, также сосъдственнымъ озерамъ и прудамъ. Неръдко онъ перепалзываеть изь одного озера въ другое, то для снисканія себъ на сухомь пути слизней, лягушекь, то для отдохновенія вь густой травъ на солнцъ. Употребляются въ пищу какъ свъжіе, такъ и мореные въ уксусв. Кожа ихъ можеть служить вмъсто пузырей и веревокъ.

Примвчаніе. Въ родъ Угрей, наипаче морскихъ, есть чрезвычайно великіе и толстые; наипаче примъчанія достоинъ Конгръ или морской Угоръ и морской Змьй, которые водятся въ Съверномъ Окіанъ и около Норвегіи, длиною часто сажени въ полтары,

- 2. Зубатка, рыба похожая на Треску; покрытая гладкою съ весьма мёлкими чешуями, изъ съра желтоватою кожею; во рту напереди имъется множество кривыхъ зубовъ, а десны и небо усажены большими тупыми зубами; хвостовое перо соединено съ спиннымъ и подхвостнымъ. Рыба величиною неръдко аршина въ два попадается, хищная и лютая. Водится въ Съверномъ Окїанъ и въ Камчаткъ, но въ пищу не употребляется; а кожа годилась бы въ дъло,
- 3. Сабля рыба или Остролисик, величиною обыкновенно аршина вы два, болье и менье; собою толстая, но кы хвосту и носу тонье; имьеть одно высокое, острое, треугольное на спинь перо, другое подыхвостомы и лунообразное вы хвость; вы прочемы кожа гладкая, вязкая, на спинь черная, поды брюхомы былая; наипаче примытна она своимы носомы, который одины у большихы иногда аршина на полтора простирается и подобены драгунскому палату, коимы она колеты прочихы рыбы и звырей, за коими гоняется. Водится во всыхы Европейскихы моряхы.

# Опавленте II.

#### О Подгорямих рыбахъ.

### \$ 99.

Подгорамми называются такія рыбы, кои подбрющныя перья имфють у себя подъ горломЪ, то есть болъе впередъ подавшіяся, нежели плечевыя перья.

#### ( IOO.

Онъ по больщой части морскія и алчныя рыбы, однако есть, кои водятся и въ сладжихъ водахъ, морямъ сосъдственныхъ; питаются раками, сельдями и всячиною.

#### § 101.

#### Къ сему отдъленію принадлежать извъстнъйшія въ Россіи.

I. Треска, рыба длиною около полутора аршина, покрыша вязкою кожею, мёлкими падучими чешуями усаженною; на спинъ имъеть три пера, подь жвостомь два; жвость ровный. Примътенъ сей родъ наипаче имъющимся подъ нижнею челюстью ускомъ. Рыба весьма алчная; водится въ открытыхъ моряхЪ, наипаче СъверномЪ, большими стадами,

ГДЪ

тав и учреждаются для нея нарочные промыслы. Употребляется въ пищу. Сколь ни велико ея въ натуръ изтребление, но чрезмърная плодовитость, не смотря на то, все сие преодолъваетъ.

2. Налимъ, поменьше Трески и имъетъ на спинъ только два пера, заднее до самаго жвоста простирающееся и подъ жвостомъ одно; цеттомъ изпещренной темными, желтоватыми и бълъсоватыми ласинами; чещуя в сьма мълкая и въ слизи почти не примътна. Водится по ръкамъ и озерамъ въ сосъдствъ морей; въ Сибирскихъ ръкахъ бывають гораздо больше Россійскихъ. Употребляется свъжій въ пищу; изъ него добывають славный въ Сибири и лучшій рыбій жиръ. Кожу дикіе народы употребляють на оконицы и шьють себъ платье.

Примвчаніе. Сюдажь принадлежать такь называемыя Россійскія рыбы, ловящіяся около Архангельскаго города въ Съверномь Окіанъ Бъльца и Напага, коихъ употребленіе и польза таже самая, какь и вышеобъявленныхъ.

#### Отдъленте III.

### О Подгрудныхъ рыбахъ.

# \$ 102.

Подгрудными называются такія рыбы, кои подбрющныя перья имѣють прямо подь плечевыми.

#### § 103.

Онт обитають частію вы моряхы, частію вы ръкахы; вст почти употребляются вы пищу, и вст сладимы, здоровы, наипаче ртчныя. Питаются разныя разно.

### \$ 104.

# Къ Подгруднымъ принадлежать:

1. Окунь, величиною въ поларшина, болѣе и менѣе; на спинѣ имѣетъ два пера черныя, а прочія, плечевыя, подбрюшныя, подхвостный и хвость красныя; наипаче Окунь примѣтенъ, что отъ спины до половины бока имѣетъ будто черные пояса; впрочемъ всѣ чешуи на немъ зубчаты. Водится въ рѣкахъ; питается иломъ, водяными травами и насекомыми.

2. Cy-

- 2. Судакт, величиною св Окуня, нобывають изв нихв и отмънной величины; цвътомв на спинъ темноватая, а къ брюху бълъе съ бълвсогатыми пятнышками; на спинъ два пера, которыя такъ какъ и всъ прочія перья черныя; во рту зубы острые. Водится въ рвкахв; рыба алчная, хищнве даже самой щуки; питается всячиною.
- 3. Ершъ, рыбка поменьше Окуня, приметна строжелтоватымь своимь цветомь, брюхо бълбе, съ темными по спинъ и перьямъ крапинками: глаза зеленые; перья на спиић два, соединенныя, переднее колкое. Водится вь ръкахь и озерахь.
- 4. Камбала, Палтусъ, бываеть различной величины; примътна наипаче, что она собою плоская; плаваеть на боку; по спинъ оть головы, а по брюху от задняго прохода до жвоста окружена безпрерывным перьемь; глаза оба на одной верхней сторонъ. Съ внъшняго виду кажется, что она такая плоская и быть должна; но нъть: положение рта и брюха доказывають, что она плавать сотворена бокомЪ, а не на брюхъ. Находится во всьхь моряхь и на устьяхь рыкь вь нихь Ша

впадающихь; плаваеть по дну. Ея много родовь; извъснивище подь особливыми именами: Вьюшка, Мотопило, Плоскуща, Воробей, Скоба и проч. Всъ наипаче ловятся въ Рижскомъ заливъ, у города Архангельскаго и въ Черномъ моръ.

- 5. Скумбра, рыбка величиною съ Сельдь и такаяжь жирная и сладкая; имфеть спинку темнозеленую съ поясками до половины бока и брюшко серебряное, на спинъ два пера, а позадь задняго и подхвостнаго имфются по пяти маленькихъ будто приперышковъ. Находится въ Черномъ моръ, гдъ она какъ свъжая, такъ и соленая составляетъ знатный торгъ, подобный сельдямъ.
- б. Кузнець, рыба плоская какъ Камбала, но плаваніе имфеть вертикальное; цвфтомь грязнозолотистая, мфакочешуйчатая сь темнымь по бокамь очкомь; на спинф и подъхвостомь по два пера. Находится въ Средиземномь и Черномь морф, гдф плаваеть весьма быстро.
- 7. Ремора, рыбка небольшая, круглотелая, длиною вы четверть или немного боле; примента

мътна наипаче своими бороздками на темъ, усаженными острыми сосочками, посредствомъ коихъ она прилипаетъ ко всякому скоро движущемуся тълу и такъ плаваетъ по неволъ. Находится въ полуденномъ Октанъ.

# Опавление IV.

# О Подбрюшных рыбахь.

# § 105.

Подорюшными называющся такія рыбы, кои подбрюшныя перья имфють позадь плечевыхь.

#### § 106.

Изъ нихъ нъкоторыя обитають безпрестанно въ ръкахъ и озерахъ или воспитыватотся въ прудахъ; другія находятся въ моряхъ, но въ извъстное время ежегодно большими стадами подымаются въ ръки и поставныя въ море сплывають. Питаются разныя разно. Употребляются всъ здъсь описанныя въ пищу свъжія или соленыя; отъ нъкоторыхъ есть особая польза.

Ш 5

§ 107.

#### § 107.

## Къ Подбрюшнымъ принадлежать Россійскія:

1. Сідмга рыба величиною аршинъ до двухъ и болье съ соразмърною шоліциною; примъшна синею своею спиною и серебрисшымъ мълкочешуйчашымъ брюхомъ. На спинъ одно перо, а ближе къ хвосту имъется маленькое жирное перышко, которое всему Семужному роду общее. Находится въ моряхъ, изъ которыхъ ежегодно походитъ большими стадами въ быстрыя ръки такъ, что подымается даже на крутъйште пороги. Питается хищничествомъ безъ всякаго разбору.

Примвискіе. На нее во всемь похожая рыба Лосось отличается только, что хвость у него не выемкою и имветь по твлу свренькія пятнышка; водится вмёстё съ Семгою; а у нась есть и озера, въ коихъ Лососи водятся отъ Семги особо. Въ Северномъ море промышляють такіяжь, на Семогь похожія рыбы, но меньше, называемыя Кунжи.

2. Форель, рыба въ польаршина и болье бывающая, съ окладу похожая на Семужку, но цвытомь сверьху грязная, подь брюхомь желтье сь красными по всему твлу глазками. Находится вь быстрыхь рыкахь, куда входить изь моря извыстнымь временемь. Рыба алчная, глотающая всячину, жирная и плавающая очень быстро.

Примвчаніе. Во всемь похожая на Форель рыба Крошина или Пеструшка, отличается только черными своими по твлу крапинками.

3. Сигъ, длиною въ полъаршина, спинка синяя, а брюшко бълое, серебряное, примътенъ наипаче верхнею своею челюстью, которая нъсколько длиннъе нижней. Находится въ ръкахъ и при томъ временемъ.

Примвчание. Похожия на Сига рыбы, собственно въ Сибирскихъ ръкахъ ловящияся суть: Муксунъ, Пыжьянъ или Хариусъ, Таймень или Липень, Омуль.

4. Нельма или Белая рыбица, величиною часто аршина въ полтора, собою белая, серебристая, спинка немного черне; приметна на наиболе угловатыми надъ жаберною закрышкою пленками и серебреными съ чернымъ зороч-

зорочкомъ глазами. Находится въ Волгь и Камъ, гдъ извъстна она подъ именемъ Бълой рыбицы; въ Сибирскихъ же ръкахъ нъсколько отличная называется Нельмою.

5. Рядушка, величиною въ четверть, вся серебристая; примътна наипаче, что во рту зубовъ нътъ и нижняя челюсть нъсколько длиннъе верхней. Приходитъ весною въръки.

Примвчаніе. Подобна ей Корюха, ксторая показывается въ ръкахъ весною всегда
первая, какъ скоро ледъ пройдетъ, и за нею
слъдуетъ Ряпушка. Въ Сибирскихъ ръкахъ
похожъ на сихъ двухъ, но немного крупнъе,
называемый Сырть или Сырокъ, изъ котораго,
сверьхъ употребленія его самого въ пищу и
заготовленія въ запасъ, изъ кишекъ моченіемъ
выгнаивають и послъ переваривають весьма
вкусной жиръ.

6. Сивтки, рыбка маленькая, имвющая спинку синюю, бока зеленоватыя, а брюшко бълве; голова у живой почти прозрачна. Нажодится въ ръкажь и озеражъ; у насъ славнъй тіе въ Бълв озерв, гдв употребляются въ пищу и свъжіе и сущеные; послъдніе весьма пахнуть вяленою рыбою.

7. Селдь, величиною въ полъаршина; внъшнимъ видомъ похожа на Ряпушку, но жирнаго того маленькаго на хвостъ перышка не
имъетъ; нижняя челюсть нъсколько длиннъе
верхней; примътна наипаче острымъ своимъ
зазубристымъ брюхомъ, которое всему Сельдяному роду собственно. Находится въ Съверномъ Окїанъ подъ самымъ полюсомъ, откуда ежегодно отправляется въ походъ безчисленными стадами по другимъ морямъ и
заливамъ, такъ что въ самое сїє время на
проходъ изъ Съвернаго моря нъсколько тысячь судовъ ждутъ для ея промысла.

Примвчаніс. КЪ СельдямЪ причислякотся ей сродственныя: Анчаусъ или Салакушка, мълкая, но сладимая и также проходная рыбка; Жельзинца или Быненая рыба, по
больше Сельди, но у насъ въ меньшемъ количествъ, въ меньшемъ употреблении и въ нъкоторыхъ только ръкахъ водится.

8. Сомъ, въ бълой рыбъ наивеличайщая, длиною около сажени; голова сверьку къ низу плоская, пасть общирная; въ верькней челюсти два уса длинные; въ нижней четыре короче; на спинъ маленькое перо; подкво-

спиное

стиное же начинается от брюха и продолжается до самаго хвостоваго пера; самый хвость представляеть вертикальный пліоскь; кожа гладкая. Находится вы рыкахы вы Черное и Каспійское море впадающихы. Рыба алчная, глотаеть все живое и мертвое, что ни попадется; по чему и вы употребленіи мало, развы пліоскы вы недостаткы другой рыбы; по томы кожа его походить на окончины; изы неяжы и пузырей сомовыхы дылають Сомовій клей.

9. Щука, обыкновенная во всѣхъ рѣкахъ хищная рыба, примѣтна плоскимъ и широкимъ своимъ на подобіе тусинаго носомъ; прочее тѣло почти четвероугольно; цвѣтюмъ зелено съ желтыми крапинками, брюхо бѣлѣе. Спиновое перо насупротивъ подхвостнато, кои оба, равно какъ и хвостовое, красноваты съ черными крапинами. Водится въ рѣкахъ только, и занесенная въ озерахъ и прудахъ. Рыба хищная и для другихъ рыбъ вредная, почти въ безпрестанномъ движеній; питаеть ся другими рыбами и что ни попадетъ. Кромѣ употребленія ея въ пищу зубы и челюх сти ея употребляются въ аптекахъ.


покруглый, длиною въ четверть и какъ у головы, такъ и у жвоста вездъ ровная, около рта имъетъ усики числомъ до осми, кожа гладкая, въ длину полосатая, брюшко краснъе. Водится въ ръкахъ въ море текущихъ, гдъ питается иломъ. Употребляется въ пищу, также вмъсто живаго Барометра въ банкахъ, водою съ пескомъ на днъ ежедневно перемъняемымъ наполненныхъ, гдъ въ хорошую погоду лежитъ на пескъ спокойно, а худую мутентемъ, сильнымъ движентемъ и зарывантемъ себя въ песокъ предвозвъщаетъ.

11. Сазань, рыба въ аршинъ, болъе и менье, имъющая чешую крупную, цвътомъ грязнозеленоватую; въ спиновомъ перъ вторая костка зубчатая; наипаче же примътенъ верхнею своею челюстью, которая длиннъе нижней и сверьхъ того въ той и другой по два коротенькихъ усковъ. Находится у насъ въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ около береговъ и заходитъ довольно далеко въ ръки. Лучшіе Сазаны ловятся въ Каспійскомъ моръ, откуда и развозятся вяленые и соленые по всей Россіи; сверхъ того изъ нихъ приготовляютъ Сазаній клей.

- 12. Карпъ, обыкновеннъйште четверти въ полтары и двъ; спина нъсколько горбовата; перо на спинъ ровное и первая костка съ зазубринами; у верхней челюсти четыре уска; прочтя перья красноваты; самъ къ спинъ грязновать изъ зелена, а къ брюху и губы золотистыя. Водится въ ръкахъ, озерахъ, и востинывается въ прудахъ, гдъ достигаеть глубокой старости.
- 13. Аннь, величиною въ четверть или немногимъ болъе, собою грязнозеленоватаго цвъту, а перья синеватыя; у рта по одному уску; весь покрытъ мълкою золотистою четуею и густою слизью. Водится въ озерахъ, прудахъ, и всъхъ стоячихъ водахъ.
- 14. Карась, величиною около полуаршина и менье, имъеть спину горбомь; чешуя крупная и цвътомь подобень Карпу; вдоль по боку по самой срединъ имъеть красныя пятнышка оть головы даже до хвоста простирающіяся. Водится вы ръкахь, озерахь и прудахь.
- 15. Плотица, Конгокъ, Гармакъ или Калинка, рыбка маленькая, величиною поменьше четверти, сверьжу синенькая, а снизу бълая серебри-

серебристая; вы хвостовомы, перв нижняя лопасть больше верьхней. Водится повсюду вы рыкахы. Употребляется ея четуя на дыло дутыхы бусы.

Примъчанге. Прочія многія рыбы сего рода описывать излишне; извъстивищія по ихь именамь вь Россіи: Елець; Чебакь; Сорога или Краснорыбица; Язь; Голапль; Подлещь; Шережь, Шерешперь или Конь; Подузца; Густера; Лещь; Вырезубъ; Чехонь; Сапа или Синтепа и проч. Всъ попадаются или въръкахь, или вь озерахь, но въ употребленіи мало, или когда ньть другой лучшей рыбы. Вообще весь Карповой родь примътень болье, что въ перепонкъ подь жаброю имьеть три распорки, и при томь всъ они будучи очень плодущи способны къ разведенію вь нарочныхь прудахь.



#### Классъ V.

#### О Насекомыхъ.

### 9 108.

Животныя имъющія кожу на тьль жесть кую, насеченную на задней части тьла буд-то поясами и не мънъе шести ногь, называются Насекомыми. По внутреннему строенію смотри § 15.

# \$ 109.

Строеніе ихъ тьла противъ прочихъ животныхъ превратное; вмъсто содержащихся внутри твердыхъ частей мягкими одътыхъ, у сихъ мягкія находятся внутри, а жесткія, утвержденіемъ мягкимъ служащія, покрывають животное снаружи; слъдовательно и явныхъ органовъ чувствъ не болье имъють, какъ два: органъ зрънія въ глазахъ, по сторонамъ головы находящихся, и органъ обонянія и осязанія, вмъсть въ усикахъ, на темъ головы сидящихъ. Дышуть отверстіями, по бокамъ ихъ тъла находящимися.

примъчсние. Глаза Насекомых вотя кажуть быть одинакими, но вы микроскопы у всъхы почти видны, состоять изы множества сложенных глазы. Чтожы касается до усковы, то еще не извъстно, какимы образомы соединены вы одномы органы два чуваства, осязание и обоняние.

# \$ 110.

Тъло ихъ раздъляется на четыре части голопу, грудь, задъ и члены.

### Siir.

Для питанія себя многія Насекомыя имѣють роть, коего челюстм подь головою сжимаются и раздвигаются сь боковь, а не сверьку и снизу; другія же питающіяся влажностями снабжены хоботкомь, или трубкою, посредствомь коея сосуть вы себя надобный имь сокь. Для движенія сь мѣста на мѣсто имѣють онѣ ноги и крылья вмѣстѣ, изь коихь первыхь по шести, послѣднихь либо два, либо четыре; нѣкоторыя не имѣя крыльевь ймѣють большее число ногь.

#### § 112.

Обитають повсюду на лицѣ земномь, такь что нѣть органическаго тѣла, нѣть части органическаго тѣла, котороебь собственнаго себѣ насекомаго не питало.

#### § 113.

Питаются такъ какъ и обитають въ разномь состояни въка своего разно; но каждое Насекомое одною токмо своею, отвества съ начала ему опредъленною пищею, тав наиболье и держаться имъетъ.

#### § 114.

Рождають яицами, коихь кладуть вы сравнени кы ихы малости удивительное множество и при томы вы такое мысто, котороебь, какы скоро молодое животное вылупится, илибы само собою служило ему сочною тищею, илибы кы тому времени пищу имы производило. Ныкоторые немногие чадолюбым, лишенные способности производить своихы дытей сами собою, награждены чрезмырною любовию кы чужимы, по чему строють имы гнызда, питають ихы, берегуть, защищають, жизни своея не жалья.

# § 115.

Изъ положенныхъ яицъ не пылупаются Насекомыя такими, каковы ихв отецв или машка были, но черпечками, пищевыми и ходовыми орудіями снабженными; изЪ коихЪ по извъстномъ времени выходить куколка, въ мъщечкъ, или безъ мъщечка, безъ всякой пищи и движенія нісколько времени пребывающая; а по томъ изъ куколки вылупается Соперзпенное Насекомог, положившему первое яичко подобное. Перемены сій во рожденій насекомых бываемыя называются препращениями. Не вст однако одинакимъ образомъ прсвращаются и всв сіи степени превращеній преходять, но есть, кои червячковое состояніе преходять вы янчки и изь онаго вылупаются въ видъ ходячей куколки и по томъ совершеннымЪ насекомымЪ становятся; дручервячковое и куколковое состоянје прешедь вь упробъ материной рождаются мълкими живыми, на совершенныхъ походящими, а послъ при приращении скидающими сь себя только кожи.

#### § 116.

Первых двух состояній черпячект и куколка хотя суть жипотныя насекомыя, но производить себь подобных не могущія, суть Несопершенныя Насекомыя.

#### \$ 117.

Польза вы нашурь, такы какы и польза и вреды собственно для человька, наиболье оты Насекомыхы несовершенныхы, нежели совершенныхы, которыя живуты только чтобы родить и быть пищею другимы животнымы.

#### \$ 118.

Насекомыя по виду и числу крыль раздъляются на седмь отдъленій: Жесткокрылыя, Полужесткокрылыя, Чешуекрылыя, Жильнокрылыя, Перепонкокрылыя, Дпукрылыя и Безкрылыя:

# Опавление І.

О Жесткокрылыхъ насекомыхъ.

## \$ 119.

Жесткокрылын сушь такія Насекомыя, кои перепонковыя свои крылья имфють со-

крытыя подъ кожужовыми, жесткими, на подобіе роговой перепонки.

#### § 120.

Онъ по большой части тяжелыя и непроворныя насекомыя; наиболе ходять; а когла лътять днемь или вечеромь темно, то разпяля жесткія свои верхнія крылья изподними перепонковыми автять савто на духЪ, покудова во что нибудь ударятся.

### § 121.

Обитають; питаются; смот. § 113.

#### § 122.

КЪ ЖесткокрылымЪ принадлежатЪ достойнъйшія примъчанія:

Жуки, имфющіе уски коротенькіе, кончащиеся головкою, а передния ноги толстыя, зубчатыя Туры, примътные высунувшимися напередъ головы оленьимъ подобными рогами. Кожевань, попадающиеся часто во всякихв съвстивъх запасахв. Носатики, приметные длинными своими носками. Гробоколы, встрвчающіеся всегда под падалищемь. Божьи Коропки, находящіяся по цвытамь. Козяпки, сидящія наиболье по листамь. Спьтляки, зна-

Щ 4

комы всякому на мокрых мъстах по изпущаемому от них около Иванова дни фосфорическому свъту. Усачи, примътные длинными своими усами и скрыпомь, который онъ поиманные въруках производять. Шланскін мухи, Скачки, Пъуны, Короткошен, подяные Тараканы и тому подобныя, всъ и въ каждомъ родъ различных цвътовъ и величины бывающія.

### Отабление II.

О Полужесткокрылыхъ насекомыхъ.

### \$ 123.

Полужесткокрылыми называются, кои вержнія крылья, прикрывающія изподнія, имітоть не столь жесткія, а гибкія.

#### § 124.

Извѣстиѣйщія изь нихь: Таракань, водящійся вь домахь и портящій по ночамь все съѣстное. Бегомоль, примѣтный особливымь своимь видомь. Сперчохъ, Кузнечикь, Кобылка, Саранча, всѣ славны больше вредомь вь домоводствѣ, нежели пользою, которая состоить ить вы томь, что некоторые народы ими пишающся. Спътоносъ, Траняная Кобылка; Клопь, Тля, Черпець и принадлежащая сюдажь дорогая Индейская Кошениль.

Примвчание. Черпецъ есть малое насекомое, величиною въ конопляное съмя, собою круглое, наполненное багрянымъ веществомъ, которое находится по кореньямъ разныхъ травь вь теплыхь местахь Украйны и Польши. Его мужики соскобливь сь корешковь замаривають вь холодной водь сь уксусомь или съ простымъ виномъ, а послъ высушивъ вь вольной печи или на солнцъ выдавливають изъ него багряное вещество и дълають лепешки; сими красять шерсть, щелкь, кожи, сафьяны и прочія матеріи; Голландцы для сбереженія весьма дорогой Индейской Кошенили примъщивають оныя половину для крашенія своих в кармазиновь. Дорога и Индейская Колцемиль есть всемЪ BO подобное нашему Червецу насекомое, но немного крупнъе. находится токмо вЪ Мексикв, дикая столь хорошая по разнымь растъніямь лъсахъ, а переносимая съ оныхъ и воспишываемая въ садахъ, лучшая, на такъ называе-Щ 5

мой Индыская Смокпа или по тамошнему Кандась. Когда сій насекомыя въ садахъ разплодятся въ великомъ множествъ, то Индъйцы собравъ ихъ (что бываетъ раза два,
либо три въ годъ) замариваютъ либо въ горячей водъ, либо въ печахъ, и такъ продають на крашеніе; ею красять сукна въ алый
и кармазинный цвътъ; изъ нея дълають краску Карминъ, также порошковыя и бумажныя румяна.

### Ошдвление III.

О Чешуекрылыхъ насекомыхъ.

### \$ 125.

Чешуекрылыми называются такія насекомыя, кои им'вють у можнатаго своего туловища четыре пространныя перепонковыя крыла, усыпанныя свержу и снизу одинакими или разноцвітными чешуйками, прилипающими оть прикосновенія кь пальцамь.

#### J 126.

Онъ лътають всъми четырьмя крылами, но не съ объ стороны вдругь какъ птицы, а одною

одною стороною послѣ другой; садятся на цвѣты, изъ коихъ со дна достають завитымъ своимъ хоботкомъ сладостную жидкость, коею питаются.

#### § 127.

Къ сему отдъленію принадлежать всв Бабочки, прекраснейшія сій, разными цвыта- ми избукрашенныя животныя, раздыляющія- ся на два сорта: на Днепныя и Ночныя; изб коихъ первыя лытають токмо днемь и примыть, что когда садятся, то крылья держать верхъ вертикально; послыднія же лытають токмо по вечерамь и ночью, наипаче когда огонь или былое что увидять, а садятся всегда крылья разложивши горизонтально.

# § 128.

Славнейшія изы нижы красотою, всё вы намять Троянскихы Героевы прозваны, всё почти иностранныя и водятся поды жаркими поясами: пользою, Шелкопая Бабочка; времоть, всё вообще, но только вы виде своемы червяковы, а наипаче роды Моли.

Примвчание. Шелкопая Бабочка собою невелика, изъ роду ночныхъ бабочекъ, цвътомь изь свра бълая, либо вь прожелть, имъющая уски гребешками. Водишся она въ Персіи и всей полуденной Азіи; нынъ разведена въ нарочныхъ заводахъ во всъхъ почти теплыхь странахь Европейскихь Государствь. Она полезна наиболъе во время своего червяковато состоянія (смот. § 115, 116, 117), вы котпоромь она упитавшись листами шелковицы, при превращении себя въ куколку опутывается на подобіе мъщечка шелковым веществомь, разматываемымь после вы известное время въ шелкъ, употребляемый, какъ извъстно, на дъло разныхъ шелковыхъ матерій. Главньйшая должность содержателя шелковых ваводов есть выводить червей вь пору, когда шелковицы разпускаются; выводить количество червей соразмърное количеству листовъ шелковицами производимыхъ; наблюдать чистоту листовъ и сараевь, и при томь чтобь послъдние были всетда въ одинакой теплотъ между пятнадцатымЪ и осмнадцатымЪ градусомЪ Реомюрова Термометра. Моль, по большой части маленькія

ленькія бабочки различных двытовы и разнымь вещамь водящіяся, весьма вредны въ домостроительства во время своего состоянія червячками, (смотр. ( 115.) в которое онъ все пожирають, все портять. Вредньйшія изь нихь: Водящаяся пь мягкой рухляди, шубахъ и шерстяныхъ матеріяхъ, которую изтреблять наилучше терпентиномъ съ водкою. Хлебная моль, которая водится въ зернахЪ хлъба поъдая все мучнистое вещество, и послъ превратясь въ совершенное насекомое (смотр. § 115.) ультаеть для положенія яичекЪ на другія цельныя зерна; и сіе то мужики называють, Хівов изв колосонь ультьль. Повдаеть хльбь сія бабочка, размножается и вновь заводится не только когда онь стоить вы поль, но и когда сжать и даже когда уже ссыпанъ въ сусеки. Избавляющся сего вреда мъщаниемъ, молочениемъ, въяніемъ, съяніемъ сквозь ръщета, по томъ кладеніемъ въ печь на полсутки, наблюдая жаръ, наипаче для тъхъ зеренъ, кои бережемъ для посъву, въ шестьдесять градусовъ Реомюрова Термометра, а которыя на печеніе хатбовь или вы продажу, для шта жары можешЪ

можеть быть во сто и болье градусовь, и вы печи могуть лежать цылыя сутки и болье; или по просту первыя сыпать вы печь спустя пять часовь, какы посаженные жлыбы изпеклись и вынуты, послыдние черезы польтора часа либо два.

#### Опавление IV.

# О Жильнокрылыхъ насекомыхъ.

### § 129.

жои имъють заднюю часть въ сравнени къ груди очень длинную; крыла четыре, длинныя же, перепонковыя и жилками переплетены на подобте сътки.

#### § 130.

Изъ нихъ однъ обитаютъ только по болотиспымъ мъстамъ и сырымъ перелъскамъ; другія не иначе какъ по жаркимъ и открытымъ солнопекамъ. Рождаются всъ въ водахъ и несовершенныя свои лъта всъ тамъ проводятъ. Питаются всъ какъ въ несовершенномъ. номъ, такъ и въ совершенномъ своемъ состояни, хищничествомъ меньшихъ себя насекомыхъ.

#### § 131.

Примъчащельнъйший сего отдъления насекомыя суть: Стрекоза или Коромысло, въ несовершенномъ своемъ видъ обитающая въ водъ и представляющая для другихъ насекомыхъ лютаго Крокодила, а въ совершенномъ на воздухъ хищнаго Ястреба. Поденка, пользующаяся совершеннымъ своимъ жизни состояниемъ покудова племя отъ себя пуститъ, что и продолжается сутки или немногимъ болъе, а послъ вскоръ и умираетъ. И проч.

### Опавленте V.

### О Перепонкокрылых в насекомых в.

#### § 132.

Перепонкокрылыя насекомыя в разсуждении крыль своих в похожи на Жильнокрылых в, но жилки в в оных в по крылам в не столько явственны и при том задияя часть не столь длина, а сверьх в того в заду им в то ядовитое жало, коим защищая себя, уколов производять на тъл опухоль.

#### § 133.


Онт рождаются и обитають въ жизнь свою на суши льтая по цвътамь и солнечнымь мьстамь; гнъзда, гдъ класть свои яица, дълають съ особливымь, каждому собственнымь искуствомь и при томь такъ, чтобъ или самое то мъсто доставляло молодому червячку пищу и все удобство, или при положени яичка препоручають заготовлять оную и послъ надь благосостояниемъ молодыять назирать любителямь чужаго потомства дядямъ. Живутъ такимъ образомъ или по одиначкъ, или большими, или меньшими обществами.

# § 134.

Въ семъ отдълении славнъйщия заключаются Навзаникъ, хищная, длинная станомъ и тончавая муха, кладущая свои яида всегда въ какое нибудь другое животное тъло, съ тъмъ чтобъ жакъ скоро червячекъ вылупится, тобъ и пища ему была готова. Шертень, дълающи гнъзда свои на подобие пчелиныхъ сотовъ, но изъ древесныхъ пылинокъ, а не изъ воску. Пчела, живущая обществомъ изъ нъсколька тысячь состоящимъ, въ которомъ самецъ или трутенъ и самка производять только только плодь, а заготовить, уложить, присмотрыть, защитить, все лежить на простых пчелахь, своих рытей производить не могши, чужими любующихся. Мураней, подобень вы семы случат пчель, но пользою, оты ихы общества произходящею, отличены: та собираеть для воспитанія дытей своихы и для пищи себь сы избыткомы меды и воскы; сей сносить вы кучу всякой дрязгы и для пиіци разные прозябаемые клейкіе соки. И пр.

Примъчание. Общество ПчелЪ ваенися Росмъ. Въ каждомъ рою одна самка, собою всъхъ прочихъ пчель и самыхъ самцовь длиниве, но паче приметна, что крылья имъетъ весьма короткія; самцы или трутни собою длинные рабочижь пчель, но короче самки, также крылья имьють длинные самки. ныхв, а короче рабочьихв, числомв отв осми соть до двухь тысячь; рабойя пчелы суть обыкновенныя Пчелы, на полв лешающия, собою небольшія, сфренькія, числомь оть пятнадцати до сорока тысячь. Лучшіе рои почитаются шести или седми фунтовые, полатая по 5376 пчель на фунть. Какь скоро рой тав нибудь поселился, то первышее авло ра-

бочих пчель замазавь вст щелки строить соты, изъ коихъ однъ ячейки опредъляють для яичекъ, кои опложенная трутнями сам. ка кладеть самкины, трупневыя и рабочія. каждое вы свои особаго строенія; другія для запасу изъ меду и воску состоящаго. По положении яичекъ самцы умерщвляются отъ рабочих в пчель, дабы напрасно трудовь их в не фли; а изв воспитанных изв янчекв двв или три самки, не могии жить въ одномъ ульв, выгоняю пводна другую и принужденуступить выльтаеть съ ньсколькью тысячами приставших в къ ней всякаго возраста и пола на другое мъсто и тамъ обселяется по образу первыхв. Всв сій общества пчель содержатся вы льсахы и около домовы, вь дуплахь, ульяхь, либо коробахь, кои чтобь всегда водились и жорошій медь и воскы приносили, главивище жозяину надобно старать. ся оберегать пчель отв холоду и голоду, по томъ стараться имъть около своего жилища лучших цввтных травь луга.



#### Отавление VI.

#### О Двукрылыхъ насекомыхъ.

#### § 135.

Дпукрылыя насекомыя суть такія, ком имьють у себя по два крыла перепонковыя, а сверых в того позады оных в имьють на по- добіе маленьких в булавочек в подвыски.

#### § 136.

Онв всв раждаются и обитають выжизнь свою вы местахы сырыхы, нечистыхы, изы коихы посредствомы хоботка своего и сосуть влажность, чемы вонючее, темы для нихы приятнее.

#### \$ 137.

Таковыя двукрылыя сущь: разные Дрики, (родь мухь), которые желая яинки свои по-ложить подь кожу извъсшному имь животы ному тъм безпокоють: Бычй быковь; Оле-ий оленей; Бараний барановь; и при томы инные изъ нихъ кладуть за кожу, другие вы ноздри, инные подь рога, а инные въ задний проходь. Мухъ около полутора ста различныхъ видовь. Слъпии, такъ какъ большия

Ъ 2

мухи,

мухи, безпокоющіє около перелёсков передь дождемь скоть и проёзжихь. Комары, водящієся наипаче около заросшихь камышемь и лісомь рікь, озерь и береговь морскихь вы полуденной Россіи. Гиппобоска, плоская и весьма живущая муха, безпокоющая по ночамь вы конюшняхь лошадей, которую яко домовова отженяють оттоль запираніемь вы стойль вонючаго козла. И проч.

#### Отделение VII.

#### О Безкрылыхъ насекомыхъ.

#### § 138.

**Безкрылыя** насекомыя суть, какЪ изъ самаго имени явствуеть, кои крыль у себл никакихъ не имъютъ.

#### \$ 139.

Онт обитають на земли, или по другимы органическимы теламы, питаясь высасываемымы изы нихы сокомы; для движения своего интенты оты шести до двухы соты ногы произподять изы яицы вылупающимися соверщенными.

#### \$ 140.

КЪ БезкрылымЪ принадлежатъ изъ извъстнъйшихъ:

Шестиногіе: Ствиоточець, водящійся вы деревянных домахь, гдв провдая дерево вилявымь вы бревнъ проходомь стучить иногда на подобіе карманных часовь. Блоха и Вошь.

Отб осми до четырнадцати ного имъющія: Клещь; Бихорхо; Паукь; въ томь числь и Тарантуль, прославленный своимь угрызеніемь, не инымь чьмь, какь музыкою льчимымь. Скорпіонь. Разные Раки морскіе и рычные; Мокрицы.

Ногъ до полутораста и болъе имъющія; Сороконожки разныя или Костянки и Іулы.

> Классъ VI. О Червяхъ.

#### § 141.

Живошныя безобразныя, одинаковаго вещества, не имъющія на тъль своемъ прямо назначенныхъ частей, ни головы, ни туловища, ни ногъ, называются Чернями.

#### 6 142.

Тъло ихъ мягко, покрыто вязкою мускуловатою кожею, посредствомъ коея они перетягиваются съ мъста на мъсто.

#### § 143.

Обитають вы сырой земля, а наиболье вы водахы сладкой и морской, гды питаются или самою влажносто, довольно для нихы питательныхы частицы содержащею, или сосуть изы другихы всякихы животныхы сокы; инные за пищею гонясь протачивають вязкую глину; другіе просверливають даже крыпчайте марморы, кы чему и снабжены или нарочными кы тому орудіями, или разтворительнымы сокомы.

#### \$ 144.

Будучи одарены детородными частями обоего пола произподять они или живыми, или яицами; а сверьжь того имеють способность размножаться и разделяя себя, или будучи разделены на части.

#### 6 145.

Польна отб них только в натурв изввстна; очень немногіе, кои собственно человвку въку полезны, или пищею, или лъкарствомъ, или въ домостроительствъ.

#### \$ 146.

Черви раздъляются на три отдъленія: на Кишкопатые, Слизкие, и Черепокожные.

#### Опавление І.

О Кишковатыхъ червяхъ.

#### 6 147-

Кишкопатые черпи называются, кои имъють тьло цилиндрическое, снаружи и снутри одинаковое и при томъ во всемъ себъ подобное, или какъ кажется будто сложенное изъ колечекъ.

КЪ сему отделению принадлежать знакомвишіе: Волосатикь, водящійся вы стоячихы водахь и впившись вь тъло за кожею ходить выбдая клетчатую плену. Круглыя Глисты, водящіяся наипаче у ребяпів. Дождепый изн Земянной черпь, находящийся вы черноземных Б поляхь и подъ навозомь. Піяпица, обыкновенная въ стоячихъ водахъ и употребляемая для кровопущанія.

Ъ 4 0 m-

#### Опавленте II.

### О Слизкихъ червяхъ.

### \$ 148.

Слизкими называются такіе черви, кои видь имьють различной, но не кишковатой; сверьхь тянущейся кожи тьло ихь покрыто еще слизью, или другимь ньчьмы жесче, нежели кожею; кромьжь того имьють еще нькоторыя особливыя части, сльды нькоторых увсть, либо подобіє ногь показующія.

#### § 149.

Обитають они вст вы моряхы, выключая садоваго слизня; питаются сокомы изы другихы животныхы, либо прозябаемыхы; произподять то живыми, то яицами.

#### § 150.

Къ Слизкимъ принадлежатъ знакомъйте: Слизенъ, попадающійся въ садахъ и огородахъ по большой части на капустъ. Гнюсъ или Карахатица, животное нарочитой величины съ двумя на спинъ глазами и осмью членами, водящаяся въ моряхъ; Морской кисслъ. Морской Зпъзды. Морской 10жъ.

Om 45-

#### Опавление III.

#### О Черепокожныхъ червяхъ.

#### § 151.

Черепокожные суть такіе черви, кои тёломь своимь и всемь видомь похожи на Слизкихь; но сверьхь тянущейся своей кожи имьють извыстковой черепь, сь коимь они родятся, до смерти сь собою повсюду нослить и который мы называемь ракопиною.

#### § 152.

Ракопины сіи, или внёшніе животных в черепки, различествують на разных в червях в числомь, видомь, величиною, цвётомь и красотою. Вообщежь раздёляются на три сорта; однё о многих в стпорках в, другія о дпух в только, третьи об одной, различнообразованной.

#### § 153.

Внутреннюю пустоту раковины наполмяеть слизкій червь, ея житель, своимь твломь точно такь, какова она есть, завитая вверьхь или плоская; ровная, горбатая и проч. Сь нею вездв онь ползаеть, питается, ростеть и увеличивается.

#### § 154.

Обитають они по большой части въ моряхъ и немногіе только въ ръкахъ и озерахъ, гдъ перетягиваются по дну раковину держа на спинъ; питаются сосаніемъ ила или другихъ разрушающихся органическихъ веществъ; другіе зарывшись въ землъ во глубинъ морской, либо приставъ къ каменьямъ и пребывая неподвижны, питаются либо тъмъ, что есть подъ ними, либо изъ окружающей ихъ водяной атмосферы; рождаютъ инные живыми, инные кидаютъ яица, изъ коихъ вылупаются молодые уже раковинками пожрытые.

#### § 155.

Польза от черепокожных главивищая состоить вы ихы черепкахы или раковинкахы, изы коихы дылается самая лучшая известь; ныкоторыхы немногихы червей ыдяты; изы раковины, имыщихы хорошее лице и лоскы, дылаюты ныкоторыя склееныя вещицы; оты инныхы получается жемчугы, дорогое сте сокровище, которое есть не что иное, какы бользы, на внутренней стороны раковины осывать.

шая; от других получали славную в древности пурпуропую краску; от инных и шелкь и проч.

#### § 156.

Славнъйшія изь раковинь по употребленію сушь: разныя Устрицы и Мышки, коихв **Бдять**; Озерныя Ракопины, служащія рисовальщикамь для содержанія красокь; ими же вь нъкоторых выкладывают внутри покоевь щекотурныя ствны; Змыныя голоики, употребляемыя у нъкоторых в народовъ для украшенія одеждъ. По ръдкости: на Морскія жемчужныя ракопины, производящія жемчугь и водящіяся по островамь Восточной и Западной Индій; Перламуть, коимь выкладывають ножныя черенья и другія вещи; Молотокъ по своей ръдкости и особливости даже между драгоцвиными щиппающійся; такв называемые Адмиралы, одинакія вишыя раковины, изЪ коихЪ дражайшій есть Принцъ Оранскій, а дорожь того такь называемая Някому не уступлю. Всв вообще, выключая первых в трехь, суть произведенія Южнаго Окіана.

#### Прибавленте

### О нѣкоторыхъ особливыхъ животныхъ и Кораллахъ.

#### \$ 157.

Есть еще тела, внешнимы своимы видомы на безлистныя растенія похожія, но
веществомы своимы либо изпесткопаго, либо
рогопаго качества, и при томы либо по всему своему телу, либо вы известныхы токмо местахы имеюты вы дирочкахы нечто
живое, шевелящееся, и таковыя называются,
первыя известковаго качества, Каменнорастыніями (Lithophyta), другія роговаго, Жипотнорастыніями (Zoophyta или Keratophyta); просто же Кораллами.

#### § 158.

Онт обитають вы водаты по большой части морскихы; нткоторыя вы стоячить сладжихы; и при томы либо одиначкою, либо большими обществами, приростая наиболте кы другимы твердымы ттламы и содтлывая общими силами животно или каменнорасты-

ніе. Питоются как сами собою, так вы тоже время питая и общее всёхы тёло, окружающею их стихіею, безы сомнёнія довольно питательных частиць для них вы себё содержащею. Произподять себё подобных либо отдёляя от себя зародыщами, либо части, послё цёлыми животными становящіяся, либо размножаются разростаясь на подобіе вётвей поколенных в.

#### § 159.

Извъстнъйшія из каменнорастьній суть былие и прасные Кораллы, растущіе вы множествь вы Средиземномы и Черномы морахы и употребляемые вы Аптекахы и на нъкоторыя издыйя. Прочія: Мадрепоры; Миллепоры и Тубипоры, изы коихы всыхы жгуты премизрядную известь. Изы животнорастый: Грецкая губка и Бадяга, первая вы моряхы другая вы рыкахы на дны, или на камняхы растущія; и прочія тому подобныя.

#### § 160.

Кромъ сихъ мълкихъ общественное тъло животно или каменнорастънія представляю-

щих в несвободных в животных в есть еще вы морях и сладких водах в мълкія животныя, свободныя, наиболье вы увеличительное токмо стекло видимыя, всяких в видовы и всячески разпложающіяся, кои извъстны поды именами: Полилы; Плоскія Глисты; Перо морекое; Кружилко; Фурія; Хаосы, и проч.

#### Конецъ.

### Роспись содержащимся въ Начертаніи Естественной Исторіи вещамъ.



# Изкопаемое Regnum fossile.

царстве.		стран. 1
АгашЪ	Achates	14
АлабастрЪ	Gypsum alabastrum	10
АлмазЪ	Adamas	15
Амбра	Ambra	32
Аметистъ	Amethystus	15
АмїантЪ	Amiantus	I2
БериллЪ	Beryllus	15
БолусЪ	Argilla bolus	
БузунЪ	Sal marinum	4 24
Бура	Borax	25
БулыжникЪ	Saxum Granites	16
Вапъ	Rubrica	11
Виниса	Granatus	
ВисмушЪ	Bismuthum	15
Гагатъ	Gagas	36.
Гіацинть		3 <b>I</b>
	Hyacinthus	
	^ ^ 얼청일이라지만 사람은 가장을 옮긴	ГипсЪ

	اهاییم ی پورم ۱۹۸۰ در در دی	стран.
Гипсь	Gypsum usuale	Io
Глина простая	Argilla vulgaris	· '4
— фарфоровая	- porcellana	4
— бледная	Marga argillacea	4
— чистильная	Marga fullonum.	. 5
— песковатая	Marga arenacea	15
Горючія вещества	Bitumina	27
ГранишЪ	Saxum Granites	17
Деготь горный	Maltha tenax	29
Дресва	Granites fatiscens	17
— блестящая	Mica	12
Жельзо	Ferrum	43
Земля пыловашая	Terra macra	2
— Аглинская	colorata	
красная		2
— болошная	— lutofa	. 3
— известковая	- calcarea	3
— глинисшая	- argillacea	4
ЗмѣевикЪ	Serpentinus	12
Золото	Aurum	41
— кошечье	Mica aurata	12
Извесшь	Calx nativa	3'
ИзвестнякЪ	Calcareus vulgaris	9
— плишной	- Aratarius	<b>9</b> /
		Извѣ-

#### страи, Calcareus sectilis Известнякъ пластовый. 10 Smaragdus 15 Изумрудь. **U**srapb Porus 47. Pyrites КалчеданЪ 33 Lapides 6 Камни - fimplices - простые ደ - aggregati - сложенные 15 Lapis ollaris Камень горимечный 11 Cos cotarius - точильный 13 - filtrum - цвдильный 13 - лещедный - quadrum 13 - жерновый - molaris 13 - дикой сливной Saxum grandaevum 16 — лазуревый<sup>в</sup> Lapis Lazuli 16 - образованный - figuratus 47 КварцЪ Quarzum 13 - 6 флый про-Quarzum lacteum зрачный 14 - полупро-- fubdiaphanum зрачный 14 Кварцовыя щешки Drusa quarzosa 14 Квасцы Alumen 24 КоболшЪ Coboltum 35 Kpg-

	Cin	ран,
Кремень	Silex	14
КровавикЪ	Haematites	44
КупоросЪ	Vitriolum	21
Магнитъ	Magnes	44
МарганцЪ	Magnesia	44
МарморЪ	Marmor nobile	10
— черный	- nigrum	10
Масло горное	Petroleum	29
Металлы	Metalla	39
Мергель	Marga	. 5
Мыловка	Talcum	11
— блестящая	Talcum lunae	
бълая	,	11
- черная	Molybdaenum plumbago	11
МышьякЪ	Arlenicum	35
МѣлЪ	Creta alba	3
— черный	Schistus nigrica	8
Мъдь	Cuprum	42
Мука горная	Farina fossilis	3
НаждакЪ	Smiris	44
Нашашырь	Sal ammoniacum	26
Нефшь	Naphta	28
Николь	Nicolum	36
Окаменълости	Petrificata	47
Олово	Stannum	44

1,		empan.
Ониксъ	Onyx	15
ОпалЪ	Opalus	15
Оперментъ	Auripigmentum	35
Осадка	Tophus	47
ОселокЪ	Shiftus coticula	8
— черный	- lapis Lydius	9
Оппечатка	Typolithus	47
Песокъ сыпучей	Arena mobilis	5
— береговый и	- inaequalis	
боровый		6
Пещаникъ	Cos glareofa	13
Перелившь	Petrofilex semipelluc	idus 14
Пермянка	Sal fontanum	23
Пемза	Pumex	48
ПлавикЪ	Fluor	15
Платина	Platina	40
Полумещаллы	Semimetalla	34
Порфиръ	Saxum porphyrius	16
ПудингЪ	Saxum filicinum	16
Ртупь	Hydrargyrum	38
РубинЪ	Rubinus	15
СвинецЪ	Plumbum	46
Селитра	/ Nitrum	22
Серебро	Argentum	41
er selen i (	Ы 2	Cepe-

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ран
Серебро кошечье	Mica argentata	12
СердоликЪ	Carneolus	15
Слюда	Mica membranacea	12
Смола жидовская	Asphaltum	30
Соли	Salia	18
— кислая	- acidum	18
— щелочная	— alcali	19
- средняя	— medium	19
- поваренная	- commune f. culinare	23
— каменная	— gemmae	23
— самосадка	- marinum	23
— проносная	mirabile Glauberi	27
Сурьма	Antimonium	37
Свра	Sulphur	33
ТрапЪ	Lapis trapezium	15
Трепель	Tripela	5
ТурфЪ горный	Ampelites	30
Уголь каменный	Lithantrax	31
Умбра	Humus umbra	2
ХалкедонЪ	Chalcédonius	15
Хризолить	Chryfolithus	. 25
Хрусталь восточны	ий Crystallus montana	14
Хрящъ	Arena sabulum	6
ЧерноземЪ	Humus atra	2
Чернь шиферная	Atramentum scissile	2

*		стран.
Шиферь столовый	Shiftus menfalis	8
— крышечной	- tegularis	. 8
Шпать	Spathum	10
- крисшалловый	arystallisatum	10
— зеркальный	- speculare	10
— двоильный	- duplicans	. 10
Шпїаутерь	Zincum	37
Янтарь	Succinum	32
Яшма	Iaspis	14
		-
	• •	w.d.
Прэзябаемое	Regnum Ve	ge-
Царство.	tabile	_ 53
Александрійскій	Cassia Senna	
листъ		171
АмпрыкЪ	Arbutus alpina	149
Ананасъ	Bromelia Ananas	232
Анисъ	Pimpinella Anisum	195
АпельсинЪ	Citrus aurantium	166
АприкозЪ или Ку-	Prunus armenica	
pera -		112
Арбузь	Cucurbita citrullus	205
Армудъ или Квитъ	Pyrus cydonia	109
АртишокЪ	Cinara fcolymus	204
	ы 3	

	1	rhain.
Багульникы или	Ledum palustre	
КлоповникЪ		135
Базиликъ	Ocymum bafilicum	209
Бакгауть	Guajacum officinale	163
Бамбукь	Arundo Bambos	230
Бедренець	Pimpinella faxifraga	226
Береза	Betula alba	88
черная	- daurica	90
Берескледь или	Evonymus Europaeus	
Брусклень		125
Бересклет в или	Crataegus oxyacantha	
БоярышникЪ		116
Бересть или Кара-	Ulmus pumila	
ravb		84
Бессь или Кандыкв	Erythronium dens cani	s 197
Бирючина	Ligustrum vulgare	150
<b>Б</b> обовник <b>Б</b>	Amygdalus nana	105
Бобы	Vicia faba	202
турецкие	Phaseolus vulgaris	202
Богородская трава	Thymus ferpillum	208
Волопный верескв	Andromeda calyculata	139
Борь или боровое	Panicum miliaceum	
пшено		215
Воярышникв	Crataegus oxyacantha	116
Боусница	Vaccinium vitis idaea	148

. ;	CI	npan.
Бузина	Sambucus nigra	124
БукЪ	Fagus filvatica	81
Буквица	Betonica officinalis	183
Вайда	Isatis tinctoria	184
ВасилекЪ	Centaurea cyanus	188
Верба	Salix caprea	93
Верескъ ягодной	Myrica Gale	151
Виноградъ	Vitis vinifera	143
Вишня	Prunus cerasus	110
Водяница	Empetrum nigrum	150
Волжанка	Agaricus cinnamomeus	239
Воловый языкЪ	Anchusa officinalis et	· ·
	tinctoria	177
Волуй	Agaricus integer	239
Воробьиное съмя	Lithospermum arvense	176
Воронець	Actæa spicata	181
ВыонокЪ	Coronilla varia	224
Вѣтла	Salix pentandra	97
Вязъ	Ulmi species	83
Вязель или Вьюнокъ	Coronilla varia	224
Галега	Galega officinalis	225
Гвоздичное древо	Caryophillus aromaticu	IS 170
Голубица	Vaccinium uliginosum	147
Гордъ	Viburnum Lantana	
	270 to 1 100 mg	Topo-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

raginarian di kacamatan di Kabupatèn Bandaran Kabupatèn Bandaran Kabupatèn Bandaran Kabupatèn Bandaran Kabupat Kabupatèn Bandaran B		стран.
Гороховикъ Си-	Robinia Caragana	
бирски	en de la companya de La companya de la companya de	102
Горчица	Sinapis alba	199
ГрабЪ или Гра-	Carpinus Betulus	
быльникЪ	2.0°2. <b></b>	
Гранатовое древо	Punica Granatus	16
<b>Т</b> ребенщик <b>Ъ</b>	Tamarix gallica	137
<b>Г</b> рибы	Fungi 💮	237
Груздь	Agaricus piperatus	239
Груша	Pyrus communis	108
Гусиная дапка	Potentilla anserina	181
Грвчиха	Polygonum fagopyrun	n 216
Дерево	Lignum	66
Дереза, Чилига или	Robinia fruticans	en e
ЖелвзнякЪ		<b>103</b>
Деренъ	Cornus mas	119
Дикой Тернь	Ulex Europaeus	225
ДонникЪ	Trifolium melilotus	223
Древа	Arbores	66
ДрокЪ	Genista tinctoria	184
ДубЪ	Quercus robur	79
Дуплянка	Agaricus violaceus	238
Душица или Маіо-	Origanum majorana	
, ранЪ	•	208
		Лыня

	C	тран-
Дыня	Cucumis Melo	205
Дятлина	Trifolium alpestre	222
Ель	Pinus abies	72
ЕрникЪ	Erica vulgaris	138
Желтука	Curcuma longa	228
ЖестерЪ или при-	Rhamnus Catarticus	
дорожная иголка		122
ЖидовникЪ	Robinia Halodendron	104
Жизненное древо	Thuia occidentalis	- 175
Жизненная травка	Mimosa sensitiva	234
Жимолость	Lonicera Xylosteum	128
Завязной корень	Tormentilla erecta	181
Звъробой	Hipericum perforatum	185
Зелень	Olus	189
Земляника	Fragaria vesca	143
Земляныя яблоки	Solanum tuberosum	191
ЗолотарникЪ или	Robinia pygmaea	
Алтагана		105
Золотая розга или	Solidago virga aurea	
ЗолотарникЪ		187
ЗолототысячникЪ	Gentiana Centaureum	178-
Золотужа	Thalictrum flavum	183
Ива .	Salix alba	96
ИлимЪ	Ulmus campestris	82
	Ы 5	Им-

	Constant Total And Constant	pan,
Имбирь	Amomum Zingiber	227
Иадигъ	Indigofera Anil	233
Ипекакуанна	Euphorbia Ipecacuanha	232
Ирга или Кизиль	Mespilus Cotoneaster	118
Mcconb	Hissopus officinalis	207
КалганЪ	Maranta Galanga	228
Калина	Viburnum opulus	118
Кампешь или чер-	Haematoxilon Campe-	. ,
ный СандалЪ	chianum	163
Канфарное древо	Laurus Camphorifera	161
Кандыкъ, см. Бессь		
Капуста	Brassica oleracea	199
КардамонЪ	Amomum Cardamomum	227
КаштанЪ	Fagus Castanea	160
Кедръ Сибирскій	Pinus Cembra	76
— Ливанскій	- Cedrus	155
Кервель	Scandix cerefolium	194
Кипарись	Cupressus sempervirens	156
Кипрей	Epilobium angustifolium	179
Кислица или Бар-	Berberis vulgaris	
барись		114
Кишнець	Coriandrum fativum	194
КленЬ	Acer Platanoides	86
Клюква	Vaccinium oxycoccus	149
	Trans	ach.

	CI	пран.
Кокосъ	Cocos nucifera	63.
Колокольчики са-	Campanula Rapun-	
довые	culus	191
Конопли	Cannabis sativa	217
Коричное древо	Laurus Cinnamomum	161
КосатикЪ	Iris pseudacorus	175
Кофейное древо	Coffea arabica	169
Крапива	Urtica dioca & urens	219
Красное древо	Switenia Mahagoni	164
Крушина	Rhamnus frangula	121
Кустарники	Frutices	131
КрыжевникЪ	Ribes groffularia	141
Лаванда	Lavandula spica	207
Лавровое древо	Laurus nobilis	160
Ладонное древо	- Benzoë	162,
Лапушникъ водяной	Nymphaea lutea et	
или Кувшинчики	alba	182
Лебеда	Atriplex hortensis	207
<b>Л</b> ен <b>Б</b>	Linum usitatissimum	218
Аилея бълая	Lilium candidum	178
Лимонное древо	Citrus medica	165
Липа	Tilia Europaea	92
Листвяница	Pinus Larix	73
Ложечная трава	Cochlearia officinalis	198
	•	Aoxb

		[
ЛохЪ	Eleagrus angustifolia	127
Лу6Ъ	Liber	67
ЛукЪ	Allium cepa	``96
АядвенецЪ	Lotus corniculatus	224
Marb	Papaver fomniferum	182
Малина	Rubus idaeus	142
— сшепная	Ephaedra monostachia	152
Маріона	Rubia tinctorum	176
МасленикЪ	Agaricus viscidus	239
Маслина	Olea Europaea	167
Медунки	Medicago fativa	223
Мехисса	Melissa officinalis	208
Миндальное древо	Amygdalus communis	167
МожжевельникЪ	Iuniperus communis	132
— Каролинской	Iuniperus Carolina	158
Морковь	Daucus carotta	193
МушеллЪ	Phellandrium Mutellina	226
МухоморЪ	Agaricus muscarius	239
Мушкатное древо	Myrthus Pimenta	168
Мхи	Muſci	234
Мята	Mentha fativa	208
Натуральная	Calamus Rotanus	
трость		207
Неклень или Па-	Acer tataricum	· ·
кленЪ.		- 28

		стран,
Овесь	Avena fativa	215
Огуречная трава	Borrago officinalis	
или Еураки		191
Огурцы	Cucumis fativus	206
Ольжа	Betula Alnus	91.
Омела	Viscum album	154
ОпенокЪ	Agaricus Cantharellus	238
Onïŭ	Papaver orientale	233
Оръхъ грецкой	Inglans regia	99
ОрѣшникЪ	Corylus avellana	IOI
Осина	Populus tremula	93
Осокорь	Populus nigra	95
— душистая	Populus balsamifera	96
ПалошникЪ	Typha latifolia	189
Пальмы	Palmae	60
Папорошники	Filices	236
ПастарнакЪ	Pastinaca sativa	194
Перецъ струч-	Capficum annuum	-
ковый		228
- черный Шпан-	Piper nigrum	
скій		229
ПестикЪ	Pistillum 4	56
Петрушка	Apium petrofelinum	199
Піонь или Марьинь	Pæonia officinalis	C SI C P
корень		183
,		

		than.
Пихта	Pinus picea	77
ПлющЪ	Haedera Helix	139
ПоганышЪ	Agaricus fimetarius	240
ПодсолнечникЪ	Helianthus annuus	188
Полынь	Artemisia absinthium	187
Порей	Allium porrum	197
Поросшы	Algae	236
ПортолакЪ	Portulaca oleracea	198
Пробковое древо	Quercus suber	159
Проскурнякъ	Althaea officinalis	184
Просомии Пшено	Milium effusum	214
Пупавка	Anthemis tinctoria	188
Пухь болошный	Eryophorum vaginatum	175
Пшеница	Triticum sativum	212
Пшеничка	Zea Mais	217
Пвтущьи головки	Hedyzarum Onobrychis	224
РакитникЪ	Cytifus hirfutus	136
Ревень копышча-	Rheum Palmatum	,
тый		179
— черенковый	Rheum Rhaponticum	180
РепикЪ′	Agrimonia Eupatorium	180
Рожа	Malva rotundifolia	184
Рожь	Secale cereale	.210
Роза	Rosa Eglanteria	145
	P	oma-

	Ċn .	пран.
Ромашка	Matricaria Chamomilla	188
РосмаринЪ	Rosmarinus officinalis	174
РыжикЪ	Agaricus deliciofus	238
Ръдька	Rhaphanus sativus	200
Рябина	Sorbus aucuparia	115
Сабина	Iuniperus Sabina	132
СабурЪ	Aloë perfoliatum	233
Cary	Cycas circinnalis	64
Салатъ	Lactuca sativa	203
Самшитъ или	Buxus sempervirens	
ПумпасЪ		164
СандалЪ	Caesalpinia Sappan	162
Сарана красная	Lilium Marthagon	178
— алая	Lilium Pomponium	178
Сасафрасовое древо	Laurus Saffafras	161
СажарЪ	Sacharum officinale	230
Свекла	Beta vulgaris	192
Селлери	Apium graveolens	196
Серпуха	Serratula tinctoria	186
СинеголовникЪ	Poterium sanguisorba	225
Слабишельная	Cassia fistula	
кашка		171
Сладкій корень	Sium sisarum	194
Слива	Prunus domestica	109
	C	√Впо-
	, A	

		Cimpan
Слепокурникъ или	Cornus sanguinea	
Свидина		120
Смоква или винныя	Ficus Carica	
ягоды		164
Смородина красная	Ribes nigrum	140
Сморчки	Phallus esculentus	240
Собачки	Bidens cernua	186
Солодковый корень	Glyzyrrhiza glabra	185
Сосна	Pinus filvestris	70
Спаржа	Asparagus officinalis	198
Срацынское пшено	Oryza fativa	332
Стручки	Pisum sativum	201
Сыворочная трава	Galii species	176
Сыровга	Agaricus lactifluus	239
ТабакЪ	Nicotiana Tabacum	177
Таволга	-Spirea crenata	134
Таловый тернов-	Hippophae rhamnoide	S
никЪ	. ,	129
ТернЪ	Prunus spinosa	111
ТеченегЪ	Rhamnus Paliurus	123
ТимонЪ	Carum carvi	195
Тись	Taxus baccata	133
Толокнянка	Arbutus uva ursi	150,
Тополь	Populus alba	94
	,	rr.

#### Рослись.

стран. Calligonum Polygonoides 138 ТорлокЪ Trifolium pratense ТрилистникЪ Туть или Шелко- Morus alba 125 📈 🧭 вица Cucurbita Pepo 204 Тыква Anethum graveolens 195 Укропъ 6E Phoenix dactylifera Финики Фисташковое древо Pistacia vera 166 Харгана Robinia Caragana 104 Хлончатое древо Goffypium arboreum 170 Humulus Lupulus Хивль 219 Flores Цвътки 173 Reseda Luteola Церьва 180 Cichorium Intubus 203 Пихорій ЧаберЪ Satureia hortenfis 207 Чайное древо Thea Bohea 170 Чишковое древо Mespilus germanica 117 Prunus Padus Черемуха 🖹 113 Vaccinium Myrtillus Черница -147 ЧерногривЪ, пьяная Rhododendron chrysanthum трава, или Кашкара 136 ЧернокленЪ Dipfacus fullonum 175 Acer campestre Чесалка 87 44ь

SE 2 1 2	CI	nbsh'
ЧеснокЪ	Alliam fativum	197
<b>Ч</b> ечевица	Ervum lens	202
Чилибуха	Strychnos nux vomica	232
Чина	Lathyrus tuberosus	224
<b>ЧистякЪ</b>	Chelidonium majus	182
Шалфей	Salvia officinalis	174
ШампиньонЪ,	Agaricus campestris	238
ШафранЪ	Crocus sativus	174
— дикой	Cartamus tinctorius	186
Шептала, Брускви-	Amygdalus Persica	
на или Персики		106
Шоколадное древо	Theobroma Cacao	163
ШпинатЪ	Spinacia oleracea	206
Щавель	Rumex acetofa	198
Яблонь	Pyrus malus	107
мки кіронда идоля	Solanum dulcamara	•
Сладкогорько		153
Ягодки	Daphne Mezereum	152
Ялаппа	Mirabilis Ialappa	231
Ясень	Fraxinus excelsior	85
Ячмень	Hordeum vulgare	211
- СхишВ	Rhamnus Lycioides	123



Живот-

Животное	Regnum and	male.
царство.	cm	ран. 241
АдмиралЪ	Conus Ammiralis	427
Аиспів	Ciconia	352
Алетъ	Squalus	379
Африканка	Numida Meleagris	367
Баба птица	Pelecanus Onocrotal	us 349
Бабочка дневная	Papilio	411
- ночная	Phalaena	411
— — шелковая	— mori	412
Бадяга	Spongia fluviatilis	429
БакланЪ	Pelecanus Carbo	350
БаранЪ	Ovis	310
БарсукЪ	Meles	280
БегемотЪ	Hippopotamus	327
Бихорхо	Phalangium	421
Блоха	Pulex	421
БобрЪ	Castor	297
БогомолЪ	Mantis .	408
Божья коровка	Coccinella	407
БоровЪ	Sus	314
Бурундукъ	Sciurus striatus	295
БыкЪ	Bos	311
Бълка	Sciurys	293
Бълуга	Acipenser Huso	380
	b 2	Бълуха

		стран.
Бълуха	Balaena	317
Велблюдь	Camelus	303
Водяной ТараканЪ	Dytifcus	408
ВолкЪ	Lupus	258
ВолосатикЪ	Gordius	423
Ворона	Cornix	343
ВоронЪ	Corvus corax	344
Вошь	Pediculus	421
Выдра	Lutra	272
Выхухоль	Sorex moschatus	284
Вьюнь	Petromyzon fluviatili	s 378
Tara	Anas mollissima	348
Тагара	Colymbus	350
Талка	Monedula	344
<b>Г</b> иппобоска	Hippobosca, Santa	420
Тлиста круглая	Ascaris Lumbricoides	423
— плоская	Taenia î	430
Тлужарь 🦪	Urogallus	357
Гнюсь, или Кара-	Saepia	
катица		424
Голубь	Columba	359
Горностай	Erminea	275
Грачь	Corvus frugilegus	344
Грецкая губка	Spongia officinalis	429
ГрифЪ	Vultur Gryphus	362
*** ** ** ***	4.	Too-

	<i>h</i>	странь
ГробокопЪ	Silpha	407
Тусь	Anfer /	347
Двуутробка	Didelphis	326
ДелфинЪ	Delphinus	319
Денонъ морской	Manis	324
ДикобразЪ	Hyftrix	327
ДраконЪ	Draco	371
ДрикЪ -	Oestrus 7	419
ДроздЪ	Turdus	354
ДудакЪ	Otis tarda	345
ДятелЪ	Picus	354
ЕжЪ	Erinaceus	282
- морской	Echinus	424
Ершь	Perca Cernua	391
ЖаворонокЪ	Alauda	360
Животнораствнія	Zoophyta	428
ЖукЪ	Scarabaeus	407
Журавль	Grus	352
ЗаяцЪ	Lepus	296
йонклмэк —	Mus Iaculus	292
Звъзда морская	Asterias	424
Звъри	Mammalia	248
Земноводныя	Amphibia	367
Змви лютый	Crotalus horridus	374
Зоологія	Zoologia	142
	P 3	300mo-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		стран.
Зоотомія	Zootomia	241
Зубатка	Anarrhichas	387
Тулъ	Iulus	421
Кабарга	Moschus moschiferus	305
Козявка	Chrysomela	407
Камбала	Pleuronectes	391
Каменнораствнія	Lithophyta	428
Камчатскій БобрЪ	Mustela Lutris	266
<b>К</b> анарейк <b>а</b>	Fringilla Canaria	367
Карась	Cyprinus Caraffius	400
Карпъ	Cyprinus Carpio	400
Кисель морской	Medufa gelatinofa	424
Клещъ	Acarus	421
КлопЪ	Cimex	409
Козелъ	Hircus	309
Кокушка	Cuculus	344
КолонокЪ	Mustela Sibirica	274
Колпица	Platalea	353
КомарЪ	Culex	420
Кораллы	Corallia	A29
Корошкошея	Buprestis	408
Коть	Cattus	264
— морской	Phoca urfina	269
Кошениль	Coccus Aonidum	409
Красный Гусь	Phoenicopterus	353
		Knee

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	c n	пран.
Кречетъ	Gyrfalco	340
КрокодилЪ	Crocodilus	391
Крохаль	Merganser	349
КротЪ	Talpa William William	283
Кружилко	Volvox	430
Крыса	Rattus	285
КузнецЪ	Zeus faber	392
Куница	Martes	2.5
Ласка	Mustela nivalis	275
<b>Л</b> асточк <b>а</b>	Hirundo	362
Лебядь	Cygnus	348
Левь	Leo	331
Динь Сов	Tinea	400
Лисица	Vulpes	26I
Лось	Alces	306
Лошадь	Equus	301
Авнивець	Bradypus tardigradus	323
Лътяга	Sciurus volans	295
Лягушка	Rana	371
Мартышка	Larus	350
Медвъдь	Urfus	278
Миногъ	Petromyzon marinus	378
Моль	Tinea Control	412
МолотокЪ	Ostrea malleus	427
Мокой или Песь	Squalus Carcharias	380
морской	<b>b</b> 4 <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	окри-

	•	стран.
Мокрица	Oniscus asellus	421
МоржЪ	Rosinarus	270
Морская Корова	Manatus	271
Муравей	Formica	417
Мушка	Trochilus Colubris	354
Муха	Musca Market	419
Мышь	Mus	286
— летучая	Vespertilio	287
— фараонова	Viverra Ichneumo	n 325 <sup>6</sup>
Мышка	Mytulus	427
Наїя	Coluber Naia	375
НалимЪ	Gadus Lota	389
Насекомыя	Infecta	402
Навздникъ	Ichneumon	416
Нельма	Salmo Nelma	395
Норка	Lutreola	273
НосатикЪ	Curculio	407
Hocoporb	Rhinoceros	328
Обезьяна	Simia	320
Однозу6Ъ	Monodon	319
Окунь	Perca fluviatilis	390
Олень	Cervus	306
ОреаЪ черный	Aquila Melanaetus	339
ОселЪ	Afinus	302
Осепрь	Acipenser Sturio	380
. 1		ПавлинЪ


		стран.
ПавлинЪ	Pavo	357
ПаукЪ	Aranea	421
Перевязка	Mustela Sarmatica	2.74
ПерламушЪ	Nautilus	.427
Перо морское	Pinnatula	430
ПесецЪ	Isatis	263
Пеструшка	Lemmus	288
Пила рыба	Squalus Pristis	380
Пискарь	Cobitis	399
Пїявица	Hirudo	423
Площица, Коніокъ, Гармакъ или Ка-	Cyprinus Alburnus	
линка		400
Полипь	Polypus	430
Попугай	Pfittacus	364
Пшицы	Aves	334
Пчела	Apis	416
ПътухЪ	Gallus	356
— Индъйскій	Gallopavo	356
Пвунь	Cicindela	408
Райская птичка	Paradifaea	364
Ракъ	Cancer	421
Ремезъ	Parus pendulinus	361
Ремора	Remora	392
Россомакъ	Gulo	281
	ь 5	Рысь

		стран
Рысь	Lynx	265
Ряпушка	Salmo albula	396
Сабля	Xiphias	387
СазанЪ •	Cyprinus Barbus	399
СверчокЪ, Саранча	Grillus	408
Свъшлякъ	Lampyris	407
Свътоносъ	Fulgora	409
Севрюга	Acipenser stellatus	380
Селдь	Clupea Harengus	397
Семга	Salmo Salar	394
Сивуча	Phoea leonina	270
Сигъ	Salmo Lavaretus	395
Скать	Raia Santa	3.79
СкачокЪ	Elater	408
СкворецЪ	Sturnus	360
Скопа	Haliaetus -	340
СкорпіонЪ	Scorpio	421
Скумбра	Scomber	392
Слепень	Tabanus	419
Слизень	Limax	424
СлонЪ	Elephas	329
Снитирь	Pyrrhula	361
Снътки	Eperlanus	396
Собака	Canis	257
Соболь	Zibellina	276
Сова	Noctua	341
СоколЪ	Falco barbarus	339
Соловей	Lufcinia	36t
СомЪ	Silurus glanis	397
	,	Copo-
		1 1

		стран.
Сорока	Pica	343
Сороконожка	Scolopendra	421
Стерлядь	Acipenser Ruthenus	380
Стрепеть	Otis Arabs	354
СтрофокамилЪ	Struthio Camelus	365
Струсь	Struthio Casuarius	366
СтвноточецЪ	Thermes	421
СудакЪ	Lucioperca	391
СурокЪ	Marmotta	291
СусликЪ	Citellus	290
Сычь	Stryx passerina	342
ТараканЪ	Blatta	408
Тарантуль	Tarantula	421
Татуй	Armadillo	325
ТетеревЪ	Tetrao	358
Turpb	Tigris	332
TAR	Aphis	409
Травяная кобылка	Cicada	409
Треска	Gadus	388
Турь	Lucanus	407
Тюлень	Phoca	267
Угорь	Anguilla	:386
— морской	Conger	386
УдавЪ	Boa	375
Усачь	Cerambyx	408
Устрица	Ostrea	427
Ушка	Anas	248
ФаетонЪ	Phaëton aethereus	365
ФичинР	Bubo	342
		Фи-

		Par Lugar
ФилинЪ белый	Stryx Nyctea	342
Форель	Salmo Fario	394
Фурія	Furia infernalis	430
ХамелеонЪ	Cameleon	372
Хаось	Chaos	430
ХомякЪ	Cricetus	291
Χορίὸκδ	Putorius	273
Цибеть	Zibetha	325
ЧервецЪ	Coccus	409
Черви	Vermes	421
- кишковатые	Intestina	423
— слизкіе	Mollusca	423
- черепокожные	Testacea	423
_ земляный	Lumbricus	423
Черепаха	Testudo	370
Чепура	Ardea	353
ЧижЪ	Spinus	× 361
Шершень	Crabro	416
Шпанская муха	Cantharis	408
ЩегленокЪ	Carduelis'	361
Щука	Efox Lucius	398
Ятилония	Lacerta	ורס י





волия 7. Лисица в Песецъ.






9. Рысь 10. Камгатской Бобов. 11. Тюлень.







12. Konto moperiore, 13. Cusyra.






14. Моржъ. 15. Морская Корова. 16. Выдра. 17. Норка. 18. Хоргонд.






19. Пересузня 20 Колононь 21. Горностай 22. Ласна 23. Куннца







4. Соболь. 25. Медетоль. 26. Варсуно.







27. Россамаха. 28. 10 ж. 29. Кроть. 30. Выску-





31. Литучая Мыши. 32, Пеструшна 33. Суолины. 34. Хомяны.






5. Cypokb

36. Typukarvanko.






37. Bitaka


38. Бурундуко.





39. Aemorra.

40. Защь.






Бобро.

42. Oce. 76 ...









43. Βερσαιος το υπιοτοροσού. 44. Βερσανικό ο πεγικό.





45. Кабарка. 46. Олеке.







7. Лапкандской Охень. 40


48. Aocs.







19. Кить. 50. Делфинь. 51. Однозубъ.







1. Camuor. 2. Comunico, Hopomoscocmase Odess. mas. 3. Odess suna cz Astunaesto Birou, uso se Neocmosus. 4. Imansento Une Sie. 5. Orex sue Horsymine tea Aepe so.






52. Mosckoù Aemonto. 53. Tamuju. 54. Papaionekart.







56. Двуутробка. 57. Дикобразб. 58. Бегемотб.





59. Носорого. 60. Слоно.





61. Левв. 62. Тихрв.





1. Терный Орект

2. Cokoxs








Ckona


4. Kperems






Cosa

6. SHITHE







7. Белой Филина


8. CBICE






9. Гага Самено. 10. Гага Самка.






11 Крожаль


12 Basa.






13 Баклано 14 Гагара.






15. Мартышка. 16: Анстъ бълон.






19. Краснон еусь. 20. Колпица






21. Дуданя 22 Стпрепетть.






23. Трифъ. 24. Попуган






25. Paŭckast Ilmurka, 26. Myurka usu Kantopu, 27. Faemono.

ţ.. . ,





28. Стоофокамиль, 29. Струсь, 30. Африкан-





Черепаха, 2. Черепаха морская, 3. Лягушка,





Пипа, 5. Драконо, 6. Ящерица!



Стора. 371.


7.

Empa: 372.





Ткрокодито в. Хамехеоно.







9. 3 мой мотый. 10. Удавг. П. Найн.






BE BEDDE nun Munoru 13. Chambe.







14. Απεπέδ. 15. Μοκοή υπα Πεςδ Μορςκού, 16. Τάπα βωσα, 17. Ο ςεπρό.







1. Угорв 2. Конвтерь 3. Зубатка 4. Сабых рыба






б. Треска 6. Налимб 7. Судако 8. Камбала или Паличев







Скумбра 10. Кузнецо 11. Ремора.






12. Ciònera 13. Mococo 14. Popeno 15. Ciero.






Віклая рыбица 17. Рянушка 18. Сыктки







Сельдь 20. Анчанов 21. Бышеная рыба 22. Сомв.






3. Пискари 24. Casanb 25. Картв.







26. Линв 27. Карасв 28. Плотища.







1. Жукъ. 2. Туръ. 3. Кожентъ 4. Носатико 5. Гробокопо. 6. Божъх Коровка 7. Козявка 8. Светско 9. Усачь. 10. Шпанская Муха 11. Скачоко 12. Петупо.






13. Коротскоинья 14. Водяной Таракано 15. Богомоло.






17. CILIBITOHOOS






6. Сарануа 18. Гравяная Кобылка. 19. Гля. 0. Червець. 21. Аневная Бабочка. 22. Ночная Бабочка.







23 Merkonan Basorka. 24. Mort. 25. Empekosa. 26. Mozenka 27. Harts, zracko







28. Шершенб. 29. Птеха, 30. Муранен. 31. Дрикв. 32. Смв = пенб. 33. Комарб. 34. Гинисововіа. 35. Стівнотокаць 36. Клещб. 37. Бихорхо.





38. Скортонь. 39. Мокрица: 40. Сорокономка 41. Костика. В Волосатько. 2. Пиниаса 3. Слизень. 4. Каракипица. 5. Морг Скоп инсель. 6. Морская Зитьяла. 7. Морской 10жь.





## MMN 3934

HINES A. 193 2.

12061951

